A microscopic view of blood cells, showing numerous red blood cells (erythrocytes) and several blue-stained platelets (thrombocytes) scattered throughout the field. The red blood cells are biconcave discs, and the platelets are small, irregularly shaped cells.

HEMATOLOGIE clinique

Pr Arnaud Jaccard

Cours en ligne

- Google : hematolim
- Enseignement
- DFGSM 3: séméiologie hématologique

ACCUEIL Université de Limoges CHU de Limoges 3CR-H Centre de Coopération en Cancérologie (Hématologie, Biologie Clinique) Enseignement Service d'Hématologie Recherche UCOG HeLim Réseau HEMATOLIM Information grand public Liens utiles Actualités Rechercher Connexion

Enseignement

Hématologie

DCEM1
DCEM3
DES Hématologie
CSCT
IFSI
Post-universitaire

Enseignement DCEM1

Le syndrome anémique	Pr A. Jaccard - novembre 2014
Diagnostic d'une anémie	Pr A. Jaccard - novembre 2014
Syndrome leucocytaire	Pr A. Jaccard - novembre 2014
Séméiologie Hématologique	Pr A. Jaccard - novembre 2014
Séméiologie lymphoïde	Pr A. Jaccard - novembre 2014
Traitements en hématologie	Pr A. Jaccard - novembre 2014
Rappels des choses indispensables	Pr A. Jaccard - novembre 2014
Cas cliniques séméiologie hémato	Pr A. Jaccard - novembre 2014

Anales des examens

Séméiologie Médicale examen septembre 2009	Pr A. Jaccard
Séméiologie Médicale examen septembre 2008	Pr A. Jaccard
Séméiologie Médicale examen septembre 2011	Pr A. Jaccard
Séméiologie Médicale examen septembre 2010	Pr A. Jaccard
Séméiologie Médicale examen mai 2008	Pr A. Jaccard
Séméiologie Médicale examen juin 2010	Pr A. Jaccard
Séméiologie Médicale examen mai 2011	Pr A. Jaccard
Séméiologie Médicale examen mai 2009	Pr A. Jaccard

- Examens : QCM

NFS

Bioch+RIA	Pharmaco.	Hémato.	Immuno.	E.F.S.
☐ 10/09/2014 ☐ 08:00 Définitive 140498872				
☐ Non conformité TTAC ☒ ☐ Prise éventuelle				
NON CONFORMITES (HEMATOLOGIE)				
CYTOLOGIE				
HEMOGRAMME, NUMERATION GLOBULAIRE				
☐ Globules blancs	☒	5.50		
☐ Globules rouges	☒	4.54		
☐ Hémoglobine	☒	13.80		
☐ Hématocrite	☒	40.6		
☐ Volume moyen globulaire	☒	89.5		
☐ Teneur corpusculaire moyenne en Hb	☒	30.3		
☐ Concentration corpusculaire moyenne en Hb	☒	33.9		
☐ I. de distribution des globules rouges	☒	13.0		
HEMOGRAMME, NUMERATION DES PLAQUETTES				
☐ Plaquettes	☒	199.0		
☐ Volume moyen plaquettaire	☒	7.50		
HEMOGRAMME, FORMULE LEUCOCYTAIRE				
☐ Polynucléaires neutrophiles	☒	58.80		
☐ Soit	☒	3.23		
☐ Polynucléaires éosinophiles	☒	4.60		
☐ Soit	☒	0.25		
☐ Polynucléaires basophiles	☒	0.70		
☐ Soit	☒	0.04		
☐ Lymphocytes	☒	31.70		
☐ Soit	☒	1.74		
☐ Monocytes	☒	4.20		
☐ Soit	☒	0.23		

Bioch+RIA	Pharmaco.	Hémato.	Immuno.
☐ 02/10/2014 ☐ 18:00 Partielle 140545279			
☐ Résultats			
NON CONFORMITES (HEMATOLOGIE)			
☐ Non conformité de réception mineure ☒ Prescrite			
☐ Non conformité TTAC ☒ Prise éven			
CYTOLOGIE			
HEMOGRAMME, NUMERATION GLOBULAIRE			
☐ Globules blancs	☒	183.00	
☐ Globules rouges	☒	1.20	
☐ Hémoglobine	☒	3.83	
☐ Hématocrite	☒	12.4	
☐ Volume moyen globulaire	☒	103.0	
☐ Teneur corpusculaire moyenne en Hb	☒	31.9	
☐ Concentration corpusculaire moyenne en Hb	☒	30.9	
☐ I. de distribution des globules rouges	☒	21.3	
HEMOGRAMME, NUMERATION DES PLAQUETTES			
☐ Plaquettes	☒	70.8	
☐ Volume moyen plaquettaire	☒	7.75	
HEMOGRAMME, FORMULE LEUCOCYTAIRE			
☐ Polynucléaires neutrophiles	☒	3.00	
☐ Soit	☒	5.49	
☐ Polynucléaires éosinophiles	☒	0.00	
☐ Soit	☒	0.00	
☐ Polynucléaires basophiles	☒	0.00	
☐ Soit	☒	0.00	
☐ Lymphocytes	☒	1.00	
☐ Soit	☒	1.83	
☐ Monocytes	☒	1.00	
☐ Soit	☒	1.83	
☐ Blastes	☒	87.00	
☐ Soit	☒	159.21	
☐ Promyélocytes	☒	3.00	
☐ Myélocytes neutrophiles	☒	3.00	
☐ Métamyélocytes neutrophiles	☒	2.00	

Montrer options d'affichage [x]			23/10/2016
☐ Globules blancs ☒			11.50
☐ Globules rouges ☒			2.76
☐ Hémoglobine ☒			9.34
☐ Hématocrite ☒			28.1
☐ Volume moyen globulaire ☒			102.0
☐ Teneur corpusculaire moyenne en Hb ☒			33.8
☐ Concentration corpusculaire moyenne en Hb ☒			33.2
☐ I. de distribution des globules rouges ☒			13.3
HEMOGRAMME, NUMERATION DES PLAQUETTES			
☐ Plaquettes ☒			2.3
☐ Volume moyen plaquettaire ☒			12.30
HEMOGRAMME, FORMULE LEUCOCYTAIRE			
☐ Polynucléaires neutrophiles ☒			70.66
☐ Soit ☒			8.13
☐ Polynucléaires éosinophiles ☒			0.39
☐ Soit ☒			0.04
☐ Polynucléaires basophiles ☒			0.05
☐ Soit ☒			0.01
☐ Lymphocytes ☒			19.50
☐ Soit ☒			2.24
☐ Monocytes ☒			9.40
☐ Soit ☒			1.08
HEMOGRAMME			
☐ Réticulocytes ☒			10.10
☐ Soit ☒			279.00

NFS

CHU DE LIMOGES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DUPUYTREN
LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE - Pr. J. FEUILLARD

2 Avenue Martin Luther King
87042 LIMOGES Cedex

Tel : 05.55.05.61.80
Fax : 05.55.05.61.85

e-mail : Laboratoire.Hematologie@chu-limoges.fr

Date de prélèvement : 15/04/2011 12:00
N° de Travail : 11333146
UF : 1030
Prescripteur : HEMATOLOGIE CLINIQUE CE
A l'attention de : JACCARD Arnaud

CYTOLOGIE (Dr. F. Trimoreau)

HEMOGRAMME (réalisé sur : ADVIA B)

NUMERATION GLOBULAIRE

Globules rouges	3.78	Tera/L	4.50-6.00
Hémoglobine	11.4	g/dL	13.0-16.0
Hématocrite	35.7	%	40.0-50.0
Volume moyen globulaire	94.0	μm^3	80.0-100.0
Teneur corpusculaire moyenne en Hb	30.2	pg	27.0-32.0
Concentration corpusculaire moy. en Hb	32.0	%	32.0-36.0
I. de distribution des globules rouges	16.8		

Globules blancs	8.90	Giga/L	4.00-9.00
-----------------	------	--------	-----------

FORMULE LEUCOCYTAIRE (décomptée au microscope)

Polynucléaires neutrophiles	84.00	%	
Soit	7.48	Giga/L	2.20-8.50
Polynucléaires éosinophiles	2.00	%	
Soit	0.18	Giga/L	<0.50
Polynucléaires basophiles	0.00	%	
Soit	0.00	Giga/L	<0.05
Lymphocytes	6.00	%	
Soit	0.53	Giga/L	0.80-4.00
Monocytes	8.00	%	
Soit	0.71	Giga/L	0.10-1.00

NUMERATION DES PLAQUETTES

Plaquettes	138	Giga/L	750-400
Volume moyen plaquettaire	10.3	μm^3	

NFS

- Quantitatif : automate
- Qualitatif : œil du cytologiste
- Sang :
 - Sérum (plasma si sang prélevé sur anticoagulant)
 - Globules blancs, rouges et plaquettes

A. Erythrocytes; C/E. Neutrophile; D. Eosinophile; J. Basophile; F. Monocyte;
 B. H. Lymphocyte; B. Lymphocyte à grains; I. Neutrophile immature;
 C. G. Plaquettes

NFS

- GB = leucocytes : 4000 à 10000 mm³
(4 à 10 giga (10⁹) /l)
- Formule :
 - Polynucléaires neutrophiles : 1700 à 7000
 - Polynucléaires éosinophiles : 50 à 500
 - Polynucléaires basophiles : 10 à 50
 - Lymphocytes : 1500 à 4500
 - Monocytes : 100 à 1000
 - Plaquettes (thrombocytes) : 150000 à 400000

NFS : lignée rouge

	Unités	Homme	Femme	N.né	1 an	10 ans
<i>G. rouges</i>	$\times 10^{12}/l$	4,5 - 6	4 - 5,4	4,5 - 6	3,5 - 5,2	4 - 5,4
Hémoglobine	g/dl	13 - 18	12 - 16	13,5-19,5	11 - 13	12,5 - 14,5
Hématocrite	%	40 - 54	35 - 47	44 - 64	36 - 44	37 - 45
VGM	Fl ou μ^3	80 - 100	80 - 100	106	70 - 86	77 - 90
<i>TCMH</i>	<i>pg</i>	30 ± 3	30 ± 3	34	23 - 31	34 - 30
<i>CCMH</i>	<i>%</i>	30 - 35	30 - 35	30 - 35	30 - 35	30 - 35

NFS

Volume globulaire moyen (VGM) :

Hématocrite (%)

Nombre de globules rouges

(exprimé en μm^3 - normales comprises entre 80 - 100 μm^3)

Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) : Hg / Hte

Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMM) : $\text{Hg} / \text{nbre de GR}$

Définitions

- Neutropénie :
 - Notable si < 1000
 - Danger si < 500
- Polynucléose neutrophile
- Éosinophilie
- Myélémie : présence d'éléments jeunes
 - Myélocytes
 - Métamyélocytes
 - Érythroblastes
- Polyglobulie
 - Hématocrite $> 54\%$ chez l'homme
 - Hématocrite $> 47\%$ chez la femme
- Monocytose :

PN < 1700

Monocytes > 1000

Montrer options d'affichage [x]		24/10/2017 07:00
		Définitive 171294237
		Résultats dif:
CYTOLOGIE		
HEMOGRAMME, NUMERATION GLOBULAIRE		
☐ Globules blancs		↑ 12.38
☐ Globules rouges		↓ 2.77
☐ Hémoglobine		↓ 8.30
☐ Hématocrite		↓ 23.8
☐ Volume moyen globulaire		85.9
☐ Teneur corpusculaire moyenne en Hb		29.9
☐ Concentration corpusculaire moyenne en Hb		34.8
☐ I. de distribution des globules rouges		15.0
HEMOGRAMME, NUMERATION DES PLAQUETTES		
☐ Plaquettes		↓ 14.0
☐ Volume moyen plaquettaire		7.70
HEMOGRAMME, FORMULE LEUCOCYTAIRE		
☐ Polynucléaires neutrophiles		0.00
☐ Soit		↓ 0.00
☐ Polynucléaires éosinophiles		0.00
☐ Soit		↓ 0.00
☐ Polynucléaires basophiles		0.00
☐ Soit		0.00
☐ Lymphocytes		5.00
☐ Soit		↓ 0.62
☐ Monocytes		0.00
☐ Soit		↓ 0.00
☐ Blastés		95.00
☐ Soit		11.76

Bioch+RIA	Pharmaco.	Hémato.	Immuno.	E.F.S. A-L	Virolo
Montrer options d'affichage [x]					24/10/2017 07:40
					Partielle 171294650
					Résultats diffusés sous la responsabilité de : Dr. Franck TRIMOREAU
CYTOLOGIE					
HEMOGRAMME, NUMERATION GLOBULAIRE					
☐ Globules blancs			↓ 0.30		
☐ Globules rouges			↓ 2.44		
☐ Hémoglobine			↓ 7.20		
☐ Hématocrite			↓ 21.1		
☐ Volume moyen globulaire			86.3		
☐ Teneur corpusculaire moyenne en Hb			29.3		
☐ Concentration corpusculaire moyenne en Hb			34.0		
☐ I. de distribution des globules rouges			16.3		
HEMOGRAMME, NUMERATION DES PLAQUETTES					
☐ Plaquettes			↓ 50.0		
☐ Volume moyen plaquettaire			8.00		
HEMOGRAMME, FORMULE LEUCOCYTAIRE					
☐ Polynucléaires neutrophiles					Trop peu de leucocytes pour faire la formule
☐ Soit					
☐ Polynucléaires éosinophiles					Trop peu de leucocytes pour faire la formule
☐ Soit					
☐ Polynucléaires basophiles					* Trop peu de leucocytes pour faire la formule
☐ Soit					
☐ Lymphocytes					* Trop peu de leucocytes pour faire la formule
☐ Soit					
☐ Monocytes					Trop peu de leucocytes pour faire la formule
☐ Soit					
☐ Blastés					
☐ Soit					

Définitions

- Neutropénie : PN < 1700
 - Notable si < 1000
 - Danger si < 500
- Polynucléose neutrophile PN > 7500
- Éosinophilie PN éos > 500
- Myélémie : présence d'éléments jeunes
 - Myélocytes
 - Métamyélocytes
 - Érythroblastes
- Polyglobulie
 - Hématocrite > 54% chez l'homme
 - Hématocrite > 47% chez la femme
- Monocytose : Monocytes > 1000

Résultats d

CYTOLOGIE

HEMOGRAMME, NUMERATION GLOBULAIRE

☐ Globules blancs	↗	↑ 30.01
☐ Globules rouges	↘	↓ 3.23
☐ Hémoglobine	↘	↓ 10.20
☐ Hématocrite	↘	↓ 32.8
☐ Volume moyen globulaire	↗	↑ 102.0
☐ Teneur corpusculaire moyenne en Hb	↗	31.6
☐ Concentration corpusculaire moyenne en Hb	↘	↓ 31.1
☐ I. de distribution des globules rouges	↗	21.1

HEMOGRAMME, NUMERATION DES PLAQUETTES

☐ Plaquettes	↗	↑ 824.0
☐ Volume moyen plaquettaire	↘	↓ 7.25

HEMOGRAMME, FORMULE LEUCOCYTAIRE

☐ Polynucléaires neutrophiles	↗	81.00
☐ Soit	↗	↑ 24.31
☐ Polynucléaires éosinophiles	↗	0.00
☐ Soit	↘	↓ 0.00
☐ Polynucléaires basophiles	↗	1.00
☐ Soit	↗	↑ 0.30
☐ Lymphocytes	↗	1.00
☐ Soit	↘	↓ 0.30
☐ Monocytes	↗	4.00
☐ Soit	↗	↑ 1.20
☐ Myélocytes neutrophiles	↗	12.00
☐ Métamyélocytes neutrophiles	↗	1.00
☐ Erythroblastes	↗	1.00

Homme de 62 ans

- LNH B zone marginale compliquée d'anémie hémolytique traité par splénectomie en 2007
- BAV 3 traité par pose de PM en 2012
- TVP fémoro-poplité droite et fémoro-ilio-cave en mai 2017
- Meningite à pneumocoque (2014)
- Hypothyroïdie
- Apnée du sommeil non appareillée
- Thrombocytémie post splénectomie

Choc septique sur cholécystite

Bioch+RIA	Hémato.	Immuno.	Virologie	B:
☐ 02/10/2017 ☐ 16:10 ☒ Définitive ☐ 170322541				
☐ Montrer options d'affichage [x] 🔔				
HEMOGRAMME				
☐ Globules blancs	☐	☐	↑ 19.04	
☐ Globules rouges	☐	☐	↓ 3.55	
☐ Hémoglobine	☐	☐	↓ 10.30	
☐ Hématocrite	☐	☐	↓ 29.6	
☐ Volume moyen globulaire	☐	☐	83.4	
☐ Teneur corpusculaire moyenne en Hb	☐	☐	29.1	
☐ Concentration corpusculaire moyenne en Hb	☐	☐	35.0	
☐ I. de distribution des globules rouges	☐	☐	16.9	
HEMOGRAMME, NUMERATION DES PLAQUETTES				

Femme de 72 ans

Syndrome myéloprolifératif évoluant depuis 1984

* Erythromyélocytose avec basophilie, blastose, micromégacaryocytes, anisocytose plaquettaire. L'ensemble évoque une myélofibrose primitive à un stade fibrotique, cf clinique ? splénomégalie ? Quelques dacryocytes.

☐ Polynucléaires éosinophiles	☐	☐	0.00	
☐ Soit	☐	☐	↓ 0.00	
☐ Polynucléaires basophiles	☐	☐	2.00	
☐ Soit	☐	☐	↑ 0.38	
☐ Lymphocytes	☐	☐	8.00	
☐ Soit	☐	☐	1.52	
☐ Monocytes	☐	☐	3.00	
☐ Soit	☐	☐	0.57	
☐ Blastes	☐	☐	3.00	
☐ Soit	☐	☐	0.57	
☐ Promyélocytes	☐	☐	9.00	
☐ Myélocytes neutrophiles	☐	☐	25.00	
☐ Métamyélocytes neutrophiles	☐	☐	8.00	
☐ Erythroblastes	☐	☐	4.00	
☐ Commentaire étude	☐	☐		

Définitions

- Neutropénie : PN < 1700
 - Notable si < 1000
 - Danger si < 500
- Polynucléose neutrophile PN > 7500
- Éosinophilie PN éos > 500
- Myélémie : présence d'éléments jeunes
 - Myélocytes
 - Métamyélocytes
 - Érythroblastes

- Polyglobulie
 - Hématocrite > 54% chez l'homme
 - Hématocrite > 47% chez la femme

- Monocytose : Monocytes > 1000

Montrer options d'affichage [x]

17/02/2012

13:45

Définitive
12314444

CYTOLOGIE

HEMOGRAMME, NUMERATION

GLOBULAIRE

☐ Globules blancs		↑ 11.30
☐ Globules rouges		↑ 7.11
☐ Hémoglobine		↑ 21.0
☐ Hématocrite		↑ 67.6
☐ Volume moyen globulaire		95.0
☐ Teneur corpusculaire moyenne en Hb		29.6
☐ Concentration corpusculaire moyenne en Hb		↓ 31.1
☐ I. de distribution des globules rouges		15.1

HEMOGRAMME, NUMERATION DES PLAQUETTES

☐ Plaquettes		378
☐ Volume moyen plaquettaire		10.4

HEMOGRAMME, FORMULE LEUCOCYTAIRE

☐ Polynucléaires neutrophiles		75.30
☐ Soit		↑ 8.51
☐ Polynucléaires éosinophiles		3.20
☐ Soit		0.36
☐ Polynucléaires basophiles		1.10
☐ Soit		0.12
☐ Lymphocytes		15.30
☐ Soit		1.73
☐ Monocytes		5.10
☐ Soit		0.58

HEMOSTASE

K.Boudjdir

Eurocord Hopital Saint louis

Définitions

- Hyperlymphocytose : lymphocytes $>$ 4500 (enfants 7000)
- Syndrome mononucléosique : présence dans le sang de grands lymphocytes activés
 - Mononucléose infectieuse (MNI) liée au virus EBV (Ebstein-Barr virus)
 - Primo-infection
 - Toxoplasmose
 - VIH
 - CMV
 - Rubéole

SYNDROME ANEMIQUE

INTRODUCTION

- **Globule Rouge : sac rempli d'hémoglobine (95% des protéines du GR)**
 - autres constituants du GR
Enzymes dont la fonction est de protéger l'hémoglobine de l'oxydation et le GR de la destruction
- **Fonction essentielle de l'hémoglobine : transport de l'oxygène.**
la baisse de la PaO₂ tissulaire entraîne la synthèse d'érythropoïétine (EPO) par le cortex rénal. L'EPO augmente la production d'érythroblastes dans la Moelle osseuse et donc de GR et d'hémoglobine
 - séjour en montagne
 - insuffisance respiratoire
 - shunt cardio-vasculaire

ANEMIE

DEFINITION

- C' est la diminution de la masse d' Hémoglobine circulante

En pratique, l'anémie se définit sur l'hémogramme par :

le taux d'hémoglobine

et non par le chiffre des GR.

- La quantité d'O₂ transportée ne dépend pas :
du nombre de GR/ml

ni de l' Hématocrite (Ht) = le volume occupé par les globules rouges dans le sang.

Ex : un Ht à 45 % signifie que dans 100 ml de sang, le plasma représente 55 ml et les globules rouges 45 ml

mais de la quantité d' hémoglobine /ml

DIAGNOSTIC POSITIF DE L'ANEMIE

CLINIQUE : Signes fonctionnels (liés au manque d'oxygène):

Signes Cardiovasculaires:

dyspnée d'effort ou de repos.

palpitations, lipothymies

douleurs liées à l'ischémie, notamment dans les territoires où les artères sont sténosées : **artérite, angor**

Signes neurosensoriels:

acouphènes, scotomes

vertiges, céphalées

Plus ou moins bruyant suivant:

- | la rapidité de l'installation +++
- | l'âge et l'état clinique +++
- | l'état cardiovasculaire
- | l'activité physique

peuvent être complètement absents

Signes généraux: **Asthénie** à l'effort puis au repos.

DIAGNOSTIC POSITIF DE L'ANEMIE

Signes Physiques:

Signe direct = Pâleur

généralisée, cutanée et muqueuse
=> évidente aux extrémités:

ongles

lèvres

muqueuse buccale

conjonctive oculaire

Masquée par :

ictère

cyanose

pigmentation raciale

Confondue avec :

myxoedème

vitiligo

Attention aux teints pâles
(regarder les conjonctives)

Signes indirects de l'anémie :

Tachycardie et souffle systolique de pointe "anorganique"
lié à l'augmentation du débit cardiaque

Signes indirects évocateurs d'une étiologie

- cheveux secs, ongles cassants, perlèche, glossite
Ferriprive

Signes Physiques:

Signes indirects évocateurs d'une étiologie

signes neurologiques :

Carence en Vit B12

ulcères de jambe

Anomalie de l'Hb

hypotrophie, retard staturo-pondéral, sd malformatif
hippocratisme digital

Origine congénitale

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE :

Le diagnostic d'anémie, suspecté ou non par la clinique **ne peut être affirmé que par l'hémogramme.**

NFS :

Définition : Hb < 13g /dl chez l'homme
< 12 g/dl chez la femme
< 10,5 g/dl chez la femme enceinte
< 14 g/dl chez le nouveau-né

Hémoglobine et pas nombre de GR :
dans les anémies microcytaires,
le chiffre de GR est normal ou élevé
mais la quantité d'Hb est diminuée.

Thalassémies:	GR	5,9 M/mm³
		Hb: 10,9g/dl
		VGM: 62μ³

Anémie :

Hémoglobine < 13 gr/dl chez l'homme

Hémoglobine < 12 gr/dl chez la femme

- Attention aux fausses anémies par hémodilution

13 gr

Normal

10 gr

anémie vraie

10 gr

hémodilution

Hémodilution

- *Grossesse* : hémoglobine 10.5 gr/dl : normale
- Splénomégalie/ ins cardiaque/ ins hépatique
- IgM monoclonale (maladie de Waldenström)
 - intérêt de la mesure de la masse globulaire totale par méthode isotopique

Éléments nécessaires à l'érythropoïèse

1 - Le fer

nécessaire à la synthèse de l'Hémoglobine.

2 - La vitamine B12 + folates

nécessaires à la synthèse de l'ADN.

3 - Les autres vitamines

Vitamine B6

Vitamine C

→ rôle dans le métabolisme du Fer

Erythropoïèse normale

- A l'état normal, équilibre entre :
 - la destruction des globules rouges (environ 1% par jour)
 - et leur production

Erythropoïèse

réticulocytes 1%

Hémolyse

destruction
macrophages
spléniques

Réticulocytes

- 24 heures puis GR
- 1% des GR
- VGM 120 μm^3
 - anémie régénérative souvent **macrocytaire**
- permet de mesurer l'erythropoïèse efficace
- < 50000 : non régénérative
- > 150000 : régénérative

proérythroblaste

E acidophile

- 5 à 7 Jours / 4 mitoses
- éléments indispensables
 - fer
 - folates, B12,
- régulée par l' **Erythropoïétine** et l'**apoptose** des érythroblastes immatures induite par les érythroblastes matures

Apoptose

- Feed back négatif impliquant le système FAS - FAS-ligand

Modifications morphologiques au cours de la maturation:

- diminution volume cellulaire et noyau
- condensation chromatine jusqu'à expulsion du noyau
- synthèse progressive Hb, changement coloration du cytoplasme avec perte de la basophilie et apparition progressive de l'acidophilie

Erythropoïétine

Purifiée en 1977

- Synthétisée par le **rein** (90%)
- principal stimulus l' **hypoxie** (taux X 1000)
- agit sur les précurseurs tardifs (CFU-E)
 - inhibition de l' apoptose
 - Prolifération
- Dosable
- Utilisée comme traitement après 1990
 - **Anémie insuffisants rénaux**
 - **Anémie post chimio**
 - **MDS**
 - **Autres**
 - Témoins de Jehovah
 - Sport d'endurance

Anémie centrale

- Inadéquation entre :
 - la destruction des globules rouges
 - et leur **production**

Erythropoïese

↓
réticulocytes

hémolyse

Anémie périphérique

- Inadéquation entre :
 - la **destruction** des globules rouges
 - et leur production

Erythropoïèse

réticulocytes

Hémolyse ou hémorragie

Anémies microcytaires

Anomalies de synthèse de l'hémoglobine :

poursuite des mitoses

→ **microcytose**

VGM < 80 m³

anomalies du
métabolisme
du fer

Thalassémie

Anémies macrocytaires

Anomalies de synthèse de l'ADN :

arrêt prématuré des mitoses

→ **macrocytose**

VGM >100 m³

déficit Folates
B12

myélodysplasies

Caractérisation des anémies

- 2 paramètres essentiels :

Classification des anémies, 4 groupes

- **Normo ou macrocytaires régénératives** : hémolyse ou hémorragies aiguës
 - **Normocytaires arégénératives** : absence d'érythroblastes, anomalies des cellules souches, défaut hormonal
 - **Macrocytaires arégénératives** : défaut de synthèse de l'ADN : carences en folates et B12
 - **Microcytaires arégénératives** : défaut de synthèse de l'hémoglobine par anomalie du métabolisme du fer
-

Anémies par défaut de synthèse de l'hémoglobine

- liées à une carence ou un défaut d'utilisation du fer
- synthèse de l'hémoglobine ralentie, poursuite des mitoses et microcytose

- **Définies par :**

- réticulocytes < 100000 / mm³
- VGM < 80

- **2 types :**

- carence vraie en Fer

Fer sérique bas, CTF , ferritine basse

- anémie inflammatoire

Fer sérique bas, CTF , ferritine normale ou élevée

Fer

Le métabolisme du fer joue un rôle important dans l'organisme par sa participation à la synthèse d'hémoglobine (dont la fonction essentielle est le transport de l'Oxygène)

Répartition du fer dans l'organisme :

Quantité totale de fer dans l'organisme
= 3 à 5 g chez l'adulte.

Fer libre très toxique +++

complexé avec des protéines dans les milieux extra et intra-cellulaires
(surcharge dangereuse, hémochromatose)

Fer réparti en plusieurs compartiments :

- compartiment fonctionnel : 70 %
érythroblastes et hémoglobine
- compartiment de stockage : 30 %
ferritine ou hémosidérine
- compartiment de transport : 0,1 %
transferrine (sidérophilline)

Fer

Etude dynamique du fer

Le métabolisme du fer s'effectue en système fermé avec échanges entre les compartiments.

en physiologie : apports et pertes sont une part infime de ce métabolisme.

en pathologie : rôle +++

Elimination, apports, besoins

Pertes physiologiques : faibles et non réglables

siège :

1 - urinaire < 0,1 mg/j (↗ si syndrome néphrotique ou hémolyse intra-vasculaire)

2- desquamatives = 1 mg/jr

↳ peau, phanères

↳ muqueuses intestinales

3- Gynécologique : femme non ménopausée
= 30 mg/cycle soit 1 mg/jr

Homme = 1 mg/jr
Femme = 2 mg/jr

Fer

Apports très supérieurs aux besoins mais absorption faible

Dans 1 régime équilibré : **10 à 15 mg/24 H**

aliments riches en Fer :

Fer héminique (viande rouge) :

boudin 18 %, rognons 15 %, foie 11 %

fer non héminique

haricots secs 7 %, fruits secs 5 %

épinards 3 %

chocolat 3 %

vin rouge !

+ farines supplémentées

absorption quotidienne 1 à 2 mg/jr soit 10 à 15 % du fer ingéré

la régulation de l'absorption peut augmenter le Fer ingéré de 3 à 5 fois

Besoins quotidiens :

↻ homme 1 à 2 mg/jr

↻ femme 2 à 4 mg/jr

↻ femme enceinte 6 mg/jr

ALIMENTS à TENEUR ELEVEE en FER (en mg/100 g)

	Foie de porc	19
	Levure de bière sèche	17,3
→	Cacao	12,5
	Caviar	11,8
	Foie de mouton	10,9
→	Lentilles	8,6
	Soja	8,4
	Pistache	7,3
→	Jaune d ' œuf	7,2
	Persil	6,2
→	Haricots blancs	6,1
	Pois cassés	6
	Moules	5,8
→	Abricots secs	5,5
	huîtres	5,5
	Amandes	4,7
	Noisettes	4,5
	Corned beef	4,3
	Figues sèches	4
	Sardines	3,5
	Noix	3,1
→	Epinards	3,1
	Côte de bœuf	3,1
	Dattes	3
	Rumsteck	2,6
	Jambon	2,3
	Vin	0,3 à 0,5
	Lait de vache	0,04

Fer

Absorption du fer

régulation de l'absorption intestinale par le *nombre de valence libre de Transferrine* dans le plasma (capacité totale de fixation de la Transferrine)

si beaucoup de valences libres:

le fer se fixe sur la Transferrine
la quantité absorbée est importante

si peu de valences libres:

le fer reste dans la cellule endothéliale,
qui desquame dans la lumière intestinale.

Régulation de l'absorption du fer : Hepsidine

- Petit peptide à activité à activité antibactérienne
- 2 types de régulation :
 - ↗ infection et inflammation (IL6)
 - ↘ carence en fer et surtout anémie (erythropoïèse)

Métabolisme du fer : Hepsidine

- Régulateur principal :
 - absorption digestive du Fer
 - relargage du fer par les macrophages

- le fer est nécessaire aux bactéries pour survivre

Fer

Pathologie de l'absorption du fer :

achlorydrie gastrique:

chirurgie => gastrectomie
médicamenteuse: + anti acides = antiulcéreux
buveur de lait
reflux biliaires

chélation du Fe^{+++} dans la lumière intestinale par:

acide citrique
phytates: céréales complètes
acide tannique (thé)
argile (géophagie...), craie, farine

malabsorption intestinale:

atrophie villositaire
cause chirurgie iléale

α -transferrinémie congénitale

Fer

Pathologie de l'absorption du fer par excès:

Régulation uniquement par l'absorption, pas de mécanisme permettant l'augmentation de l'élimination

hémochromatose familiale

- mutations sur le **gène HFE C282Y**

qui ↗ l'absorption du fer par l'intermédiaire de l'hepcidine

- mutations des autres protéines

DMT1, ferroportine

Hémochromatose

Fer

Rôle central du foie

- ◆ lieu de synthèse (ferritine + transferrine)
- ◆ lieu de réserve (macrophages + hépatocytes)

si les réserves s'épuisent :

baisse de synthèse de ferritine.
augmentation de la synthèse de Transferrine et baisse de la
synthèse d'hepcidine
augmentation de l'absorption digestive.
libération des réserves de ferritine afin de maintenir
le pool ferrique
mobilisation vers compartiment fonctionnel
l'anémie apparaît en dernier

si les réserves augmentent :

augmentation de la synthèse de ferritine pour accumuler le fer
sous forme de réserves + augmentation hémossidérine.
diminution de la synthèse de Tf et augmentation de la synthèse
d'hepcidine d'où diminution de l'absorption digestive

Fer

Dysfonctionnement : inflammation

Les macrophages, activés par **IL1 + INF α** , sous l'action de l'hepcidine **accumulent le fer dans les réserves sans libération dans le pool circulant :**

élévation ferritine et hémosidérine dans les tissus

- au maximum hémochromatose,
coloration de Perls = nombreux sidéroblastes dans la MO.

diminution transferrine et du pool ferrique circulant.

diminution du fer fonctionnel dans le compartiment érythroblastique

- érythroblastopénie
- anémie.

DONC les Anémies Inflammatoires sont:

microcytaires

avec une transferrine basse ou normale désaturée

la ferritine est augmentée

coloration Perls : Fer stocké dans les macrophages

Fer

Exploration du métabolisme du Fer

Explorations statiques

- ◆ Fer sérique (sidérémie)

- ◆ Transferrine

- **Dosage Radio-Immunologique :**

vn 1,70 - 3,30 g/l mais varie en fonction
du sexe et de l'âge.

- **Valeur calculée:**

Capacité Totale de Fixation du Fer (CTF)

Fer sérique + capacité latente de fixation
(1/3) (2/3)

Coefficient de saturation VN : 30 %

rapport fer sérique / CTF

Fer

◆ Exploration des réserves :

➤ ferritine circulante :

- ↪ varie parallèlement aux réserves
- ↪ dosage RI fiable
- ↪ valeurs normales :
 - chez l'homme : 30 - 300 ng/ml
 - chez la femme : 20 - 200 ng/ml

➤ Coloration de Perls :

- ↪ Fer non hémoglobinique se colore par le ferrocyanure de K sous forme de **grains bleu de Prusse**.
- ↪ en physiologie, sur la MO et le foie, =
10 % érythroblastes avec 1 à 3 grains:sidéroblastes.
- ↪ en pathologie:
 - sidéroblastes en couronne ou « ring sidéroblastes »
 - accumulation de fer dans les mitochondries
périnucléaires

Anémies par carences en fer

- Presque toujours **microcytaires non régénératives**
 - liées à un défaut de synthèse de l' hémoglobine
 - **Fer sérique bas, CTF augmentée, CS bas, ferritine basse**
 - souvent dévoilées à l' occasion d' une augmentation des besoins :
 - grossesse
 - après hémorragies aiguës
 - après début d' un **traitement par EPO**
 - **thrombocytémie** souvent associées
-

	10/06/2009 13:30 Définitive 0906P384810	10/06/2009 13:30 Définitive 090145695	10/06/2009 13:30 Définitive 09348123	10/06/2009 13:30 Définitive 090145661	21/04/2009 00:00 Définitive 090102504	NORM	UNIT
Capacité de fixation	↗ ↑ 84					43-80	µmol/L
Coefficient de saturation	↘ ↓ 0.04					0.17-0.40	

CYTOLOGIE

HEMOGRAMME, NUMERATION GLOBLAIRE

Globules blancs	↗		6.60			4.00-9.00	Giga/L
Globules rouges	↗		4.52			4.50-6.00	Tera/L
Hémoglobine	↗		10.3			13.0-16.0	g/dL
Hématocrite	↗		33.9			40.0-50.0	%
Volume moyen globulaire	↗		75.0			80.0-100.0	µm³
Teneur corpusculaire moyenne en Hb	↗		22.8			27.0-32.0	pg
Concentration corpusculaire moyenne en Hb	↗		30.3			32.0-36.0	%
I. de distribution des globules rouges	↗		15.9				

HEMOGRAMME, NUMERATION DES PLAQUETTES

Plaquettes	↗		510			150-400	Giga/L
Volume moyen plaquettaire	↗		9.6				µm³

HEMOGRAMME, FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires neutrophiles	↗		68.60				%
Soit	↗		4.53			2.20-6.50	Giga/L
Polynucléaires éosinophiles	↗		3.80				%
Soit	↗		0.25			<0.50	Giga/L
Polynucléaires basophiles	↗		0.50				%
Soit	↗		0.03			<0.05	Giga/L
Lymphocytes	↗		16.90				%
Soit	↗		1.12			0.80-4.00	Giga/L
Monocytes	↗		10.20				%
Soit	↗		0.67			0.10-1.00	Giga/L

HEMOGRAMME

Réticulocytes	↗		1.8				%
Soit	↗		79.00				Giga/L

Anémies inflammatoires

- Non régénératives
- microcytaires
- fer sérique bas mais
 - CTF basse, CS nl ou diminué
 - ferritine normale ou élevée
- **3 mécanismes :**
 - durée de vie des hématies
 - érythropoièse (EPO insuffisante et cytokines inhibitrices)
 - synthèse d ' hepcidine par le foie

Anémies inflammatoires

- synthèse d ' hepcidine par le foie :

- inhibition de l ' absorption de fer intestinal
- blocage du fer à l ' intérieur des macrophages :

traitement par le fer non efficace

Éléments nécessaires à l'érythropoïèse

1 - Le fer

nécessaire à la synthèse de l' Hémoglobine.

2 - La vitamine B12 + folates

nécessaires dans les synthèses de DNA.

Vitamines nécessaires pour l'hématopoïèse

Acide Folique (B9): vitamine hydrosoluble

besoins: 200 à 400 mg/j

apport alimentaire: légumes verts frais,
foie, levure,
thermolabile

+ réserves faibles 1 à 4 mois

absorption intestinale proximale
sous forme d'A. monoglutamate

Vitamines nécessaires pour l'hématopoïèse

Vitamine B12: vitamine hydrosoluble

besoins: 3 $\mu\text{g}/\text{j}$

métabolisme:

apport alimentaire:

protéines animales: viandes, poissons, oeufs, lait

réserves : 5ans

absorption:

estomac: dissociation par HCl

sécrétion de **Facteur Intrinsèque**

intestin distal: récepteur pour FI+B12

dissociation FI-B12: B12 absorbée

si carence: accumulation d'un précurseur toxique

pour la myéline: acide acétyl malonyl CoA

ELEMENTS NECESSAIRES à l'ERYTHROPOIESE

	Vit. B12	Folates
Chimie	<p>F. physiologiques instables</p> <ul style="list-style-type: none"> - methylcobalamine - de OH adenosyl Coba. <p>F. thérapeutiques stables</p> <ul style="list-style-type: none"> - OH Cobalamine - cyanocobalamine 	<p>F. physiologiques instables</p> <ul style="list-style-type: none"> - DHF, THF. <p>F. thérapeutiques stables</p> <ul style="list-style-type: none"> - A. folique - A. folinique (monoglutamate)
Métabolisme	foie	foie
- réserves	2-5 mg (stock 3-4 ans)	10-15 mg (stock 3 semaines)
- besoins quotidiens	2-5 µg	50-100 µg > si croissance, grossesse
- apports alimentaires	protéines animales	légumes verts
Absorption		
- lieu	iléon distal	jéjunum proximal
- transf.	Hcl ⇌ B12 ⇌ FI + B12 + récepteur complexe	polyglut. ⇌ monoglut.
Transport	TCI ⇌ granuleux TCIII ⇌ granuleux TCII ⇌ foie libère la B12 au tissu	libres dans le plasma liées aux protéines
Pertes	minimes	minimes

Méthodes d'exploration:

Dosages directs:

=> à effectuer avant traitement +++

◆ A. Folique

carence si :

=> taux sérique < 15 ng/ml

◆ B12

carence si taux sérique < 200 pg/ml

Anémies par défaut de synthèse de l'ADN

Über eine eigentümliche Form von progressiver, perniziöser Anaemie
18 février 1872

- Carence en Vit B12 : **maladie de Biermer**

- pathologie auto-immune (ac anti-cellules pariétales gastriques et anti facteur intrinsèque)
- carence d'apport exceptionnelle (réserve 5 ans)
- atrophie muqueuse gastrique

Muqueuse normale

Atrophie villositaire totale

- anémie très macrocytaire (VGM

- forme pseudo leucémie aiguë
- avortement intra médullaire

LDH très élevées

Anémies par défaut de synthèse de l'ADN

- Carence en folates

- réserves faibles (quelques semaines)
- carences aiguës fréquentes si nutrition parentérale sans apport
- tableau de pancytopénie avec thrombopénie profonde

Insuffisances quantitatives de l' érythropoiëse

- Aplasie

Moelle normale

Aplasie

Insuffisances quantitatives de l'érythropoïèse

- Origine hormonale

- insuffisance thyroïdienne

des besoins en oxygène

- insuffisance rénale

érythropoïétine

A rechercher avant exploration invasive ++++

Autres anémies centrales:

- ◆ dues à un défaut de production.

La moelle n'assure plus sa fonction érythropoïétique:

→ **réticulocytose basse** < 100 000/mm³

- anomalie du tissu de soutien: **myélofibrose**

- envahissement médullaire qui diminue l'espace fonctionnel des érythroblastes.

Cellules hématopoïétiques: Leucémies

Cellules non hématopoïétiques: Métastases

- défaut de la sensibilité des érythroblastes à EPO : *Erythroblastopénie constitutionnelle (Blakfan-Diamond).*

- inhibition immunologique de l'érythropoïèse: *Ac anti-érythroblastes des thymomes ou après traitement par certaines formes d'érythropoïétine synthétique*

Erythroblastopénie

CYTOLOGIE		
HEMOGRAMME, NUMERATION GLOBULAIRE		
☐ Globules blancs	☒	↑ 17.38
☐ Globules rouges	☒	↓ 2.11
☐ Hémoglobine	☒	↓ 9.10
☐ Hématocrite	☒	↓ 5.1
☐ Volume moyen globulaire	☒	85.0
☐ Teneur corpusculaire moyenne en Hb	☒	29.4
☐ Concentration corpusculaire moyenne en Hb	☒	34.1
☐ I. de distribution des globules rouges	☒	13.1
HEMOGRAMME, NUMERATION DES PLAQUETTES		
☐ Plaquettes	☒	↓ 108.0
☐ Volume moyen plaquettaire	☒	8.80
HEMOGRAMME, FORMULE LEUCOCYTAIRE		
☐ Etude morphologique	☒	Effectuée
☐ Polynucléaires neutrophiles	☒	85.00
☐ Soit	☒	↑ 14.77
☐ Polynucléaires éosinophiles	☒	0.00
☐ Soit	☒	0.00
☐ Polynucléaires basophiles	☒	0.00
☐ Soit	☒	0.00
☐ Lymphocytes	☒	13.00
☐ Soit	☒	2.26
☐ Monocytes	☒	2.00
☐ Soit	☒	0.35
☐ Commentaire étude morphologique	☒	Voir formu
HEMOGRAMME		
☐ Réticulocytes	☒	0.09
☐ Soit	☒	2.70

MYELOGRAMME		
☐ Préleveur	☒	Chauseix Jasmine (interne)
☐ Secteur du prélèvement	☒	Iliaque
☐ Dureté de l'os	☒	Normale
☐ Aspiration	☒	Facile
☐ RICHESSE DES ETALEMENTS	☒	Normale
☐ Myéloblastes	☒	0.5
☐ Promyélocytes	☒	8.0
☐ Myélocytes neutrophiles	☒	24.5
☐ Métamyélocytes neutrophiles	☒	9.5
☐ Polynucléaires neutrophiles	☒	48.0
☐ Myélocytes éosinophiles	☒	1.0
☐ GRANULEUX TOTAUX	☒	91.5
☐ Lymphocytes	☒	7.0
☐ Monocytes	☒	0.5
☐ Blastés	☒	1.0
☐ MEGACARYOCYTES	☒	Normaux
☐ Commentaire:	☒	Moelle riche Assez nombreux mégacaryocytes. Erythroblastopénie totale. Lignée granuleuse d'aspect réactionnelle
☐ Conclusion:	☒	Erythroblastopénie totale. Tube transmis en virologie

Langues : **Français** | English | Español | Deutsch | Italiano | Português

Accueil
Aide
Nous contacter

Le portail des maladies rares et des médicaments orphelins

[Maladies rares](#) | [Médicaments orphelins](#) | [Centres experts](#) | [Tests diagnostiques](#) | [Recherche et essais cliniques](#) | [Associations](#) | [Professionnels et institutions](#) | [Autres informations](#)

[Recherche](#) | [Rechercher par signe](#) | [Classifications](#) | [Gènes](#) | [Encyclopédie pour tout public](#) | [Encyclopédie pour professionnels](#) | [Orphanet Urgences](#)

[Accueil](#) » [Maladies rares](#) » [Recherche](#)

Sélectionner une langue ▼ Imprimer

Fourni par Google™ Traduire

RECHERCHE SIMPLE	AUTRE(S) OPTION(S)
<input type="text" value="erythroblastopénie"/> * (*) Champ obligatoire	> Liste alphabétique
☒ Nom de maladie → OK ☐ Nom de gène ☐ numéro MIM ☐ Code CIM 10 ☐ Numéro Orphanet	

Maladie de Blackfan-Diamond

Numéro Orphanet	: ORPHA124	Synonyme(s)	: Anémie aplasique pure congénitale
Prévalence des maladies rares	: 1-9 / 1 000 000		: Anémie de Blackfan-Diamond
Hérédité	: Autosomique dominant		: Anémie hypoplasique congénitale de Blackfan-Diamond
Âge d'apparition	: Néonatal/petite enfance		: Erythroblastopénie congénitale
Code CIM 10	: D81.0		: Syndrome d'Aase
numéro MIM	: 105850 [↗] 808129 [↗]		: Syndrome d'Aase-Smith II
	: 808164 [↗] 810829 [↗]		
	: 812527 [↗] 812528 [↗]		
	: 812581 [↗] 812582 [↗]		
	: 812583 [↗] 813308 [↗]		
	: 813309 [↗]		

RÉSUMÉ

L'anémie de Blackfan-Diamond (ABD), ou érythroblastopénie congénitale, se présente comme une anémie arégénérative le plus souvent macrocytaire. Son incidence annuelle a été estimée à 1/150 000 dans les pays Européens. Les deux sexes sont également atteints et tous les groupes ethniques sont

Informations complémentaires

Plus d'information sur cette maladie

- > Classification(s) (5)
- > Gène(s) (9)

ANEMIES HEMOLYTIQUES

- ◆ anémies liées à la destruction excessive des hématies par une :
 - **anomalie corpusculaire** → hématie pathologique
 - **anomalie extra-corpusculaire** → hématie normale
détruite par un agent extérieur
- Raccourcissement de la durée de vie des GR

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE SUR L'HEMOLYSE

- ◆ L'hémolyse est un phénomène irréversible conduisant à la destruction des GR, et la libération de leur contenu :
 - en intra-tissulaire (rate +++, foie) : macrophages*
 - en intra-vasculaire*

2 tableaux cliniques différents selon le lieu d'hémolyse

hémolyse chronique → intra-tissulaire
hémolyse aigüe → souvent intra-vasculaire

Hémolyse intratissulaire

➤ En physiologie: GR vieillis (120 jrs)

ralentissement métabolique
altérations membranaires
phénomènes oxydatifs
hyperhydratation => sphéricité
diminution de la plasticité.
captation par les macrophages
= phagocytose dans MO + foie + rate

➤ En pathologie: exagération de l'hémolyse physiologique:

Héme

protoporphyrine

bilirubine très lipophile transportée
par albumine vers le foie.

bilirubine conjuguée hydrosoluble

bile → selles → **stercobilinogène**

réabsorption → **urobilinogène**

hème → **fer** capté par les érythroblastes

AA de la globine sont réutilisés pour de
nouvelles synthèses protéiques

Hémolyse intravasculaire

Rôle variable

en physiologie: lieu mineur d'hémolyse

en pathologie: lieu majeur si hémolyse aigüe

Anémies hémolytiques

◆ Devenir des constituants : libération dans la circulation

➤ membrane

phospholipides intravasculaires

CIVD (coagulation intravasculaire disséminée)

➤ cytoplasme

K⁺ : **hyperkaliémie**

LDH

➤ Hb : **hémoglobinémie et bilirubine libre.**

adsorbée par les protéines sériques haptoglobine = complexe hapto-hémoglobine

→ **effondrement de l'haptoglobine libre**

oxydation en méthémoglobine et conjugaison à l'albumine : méthémalbuminémie.
qui est ultrafiltrée par le glomérule et réabsorbée par le tubule

tubulopathie => Insuffisance rénale

hémoglobinurie : urines " Porto " (intense et aigue)

hémosidérinurie urines claires
(modérée et chronique)

Anémies hémolytiques 2/10/2018

DIAGNOSTIC POSITIF :

Hémolyse chronique :

Clinique : triade hémolytique

pâleur

ictère cutanéomuqueux

selles non décolorées

urines orangées (permet de dater le début
de l'hémolyse)

splénomégalie

Anémies hémolytiques : Biologie

Signe d'hémolyse :

anémie

augmentation des produits du catabolisme GR

bilirubine libre élevée

haptoglobine effondrée

augmentation des LDH

(augmentation du fer sérique)

Signe de régénération médullaire : 20/10/2014

MO: Erythroblastose médullaire > 30 %

Sang: réticulocytose > 120000/mm³

Anémies hémolytiques : formes de Diagnostic difficile

formes chroniques difficiles:

anémie discrète, compensée (augmentation des réticulocytes)
hémolyse + erythroblastopénie (non régénérative)

formes aiguës:

cliniquement:

choc anurique +++
douleurs lombaires ++
douleurs abdominales aiguës atypiques
↳ Urines "Porto"

urgence vitale+++

biologiquement:

anémie aiguë
CIVD, hyperkaliémie, LDH++
hémoglobinémie plasmatique ++
hémoglobinurie ++

CYTOLOGIE

HEMOGRAMME, NUMERATION GLOBULAIRE

☐ Globules blancs	↘	4.40
☐ Globules rouges	↘	↓ 2.00
☐ Hémoglobine	↘	↓ 8.9
☐ Hématocrite	↘	↓ 24.5
☐ Volume moyen globulaire	↘	83.0
☐ Teneur corpusculaire moyenne en Hb	↘	29.7
☐ Concentration corpusculaire moyenne en Hb	↘	35.8
☐ I. de distribution des globules rouges	↘	13.4

4.00-9.00	Giga/L
4.50-6.00	Tera/L
13.0-16.0	g/dL
40.0-50.0	%
80.0-100.0	µm³
27.0-32.0	pg
32.0-36.0	%

HEMOGRAMME, NUMERATION DES PLAQUETTES

☐ Plaquettes	↘	274
☐ Volume moyen plaquettaire	↘	8.5

150-400	Giga/L µm³
---------	---------------

HEMOGRAMME, FORMULE LEUCOCYTAIRE

☐ Etude morphologique	↘	Effectuée
☐ Polynucléaires neutrophiles	↘	70.00
☐ Soit	↘	3.08
☐ Polynucléaires éosinophiles	↘	2.00
☐ Soit	↘	0.09
☐ Polynucléaires basophiles	↘	0.00
☐ Soit	↘	0.00
☐ Lymphocytes	↘	13.00
☐ Soit	↘	↓ 0.57
☐ Monocytes	↘	12.00
☐ Soit	↘	0.53
☐ Myélocytes neutrophiles	↘	1.00
☐ Métamyélocytes neutrophiles	↘	1.00
☐ Lymphocytes activés	↘	1.00
☐ Commentaire	↘	Anisocytose très modérée sans autre anomalie morphologique significative sur les érythrocytes. Pas d'anomalie morphologique sur les leucocytes.

	%
2.20-6.50	Giga/L
	%
<0.50	Giga/L
	%
<0.05	Giga/L
	%
0.80-4.00	Giga/L
	%
0.10-1.00	Giga/L
	%
	%
	%

HEMOGRAMME

☐ Réticulocytes	↘	2.6
--	---	-----

%

		19/08/2011 16:00 Définitive 110261258	Normes	Unités
CHIMIE DU SANG (BIOCHIMIE)				
IONOGRAMME				
☐ Sodium	↘	139	132-146	mmol/L
☐ Potassium	↘	3.6	3.5-5.1	mmol/L
☐ Chlore	↘	104	98-107	mmol/L
SUBSTRATS				
☐ Urée	↘	6.2	1.7-8.3	mmol/L
☐ Créatinine	↘ ↓	61	62-106	μmol/L
☐ Calcium	↘	2.25	2.10-2.60	mmol/L
☐ Phosphore	↘ ↓	0.70	0.87-1.45	mmol/L
☐ Acide urique	↘	227	202-417	μmol/L
☐ Bilirubine totale	↘ ↑	134	<17	μmol/L
☐ Bilirubine directe	↘ ↑	7	<5	μmol/L
ENZYMES				
☐ TGO (ASAT)	↘	28	<38	UI/L
☐ TGP (ALAT)	↘	12	<42	UI/L
☐ Phosphatases alcalines	↘	98	40-129	UI/L
☐ Gamma-GT	↘	12	8-61	UI/L
☐ LDH	↘ ↑	763	135-225	UI/L
BILAN PROTEIQUE				
☐ CRP	↘ ↑	12	<5	mg/L
☐ Haptoglobine	↘ ↓	<0.10	0.56-1.50	g/L
☐ Céruloplasmine	↘	0.28	0.15-0.60	g/L

	111722870	111721491
GROUPES SANGUINS (EFS Aquitaine-Limousin)		
☐ Groupe ABO D	↘	
ANTICORPS IRREGULIERS (EFS Aquitaine-Limousin)		
☐ R.A.I.-Dépistage	↘ Positif	Positif
☐ R.A.I. - Identification	↘ Autoanticorps sans spécificité	Autoanticorps sans spécificité
PHENOTYPES (EFS Aquitaine-Limousin)		
☐ Antigène C (RH2)	↘	Négatif
☐ Antigène E (RH3)	↘	Négatif
☐ Antigène c (RH4)	↘	Positif
☐ Antigène e (RH5)	↘	Positif
☐ Antigène Kell (KEL1)	↘	Négatif
☐ Antigène Jka (JK1)	↘ Négatif	Négatif
☐ Antigène Jkb (JK2)	↘ Positif	Positif
TEST de COOMBS DIRECT (EFS Aquitaine-Limousin)		
☐ Tes Coombs Direct IgG	↘	Positif
☐ Test Coombs Direct C3d	↘	Négatif

	25/08/2011 06:00 Définitive 11078825	24/08/2011 06:00 Définitive 11078492	23/08/2011 08:00 Définitive 11078131	22/08/2011 12:00 Définitive 11077879	21/08/2011 09:00 Définitive 11077539	20/08/2011 10:00 Définitive 11077257	Normes	Unités
CYTOLOGIE								
HEMOGRAMME, NUMERATION GLOBULAIRE								
☐ Globules blancs	↘	↑ 13.90	↑ 16.10	↑ 14.50	8.20	6.80	5.40	4.00-9.00 Giga/L
☐ Globules rouges	↘	↓ 1.97	↓ 2.21	↓ 1.78	↓ 1.58	↓ 2.07	↓ 2.67	4.50-6.00 Tera/L
☐ Hémoglobine	↘	↓ 6.4	↓ 7.0	↓ 5.7	↓ 4.9	↓ 6.6	↓ 8.0	13.0-16.0 g/dL
☐ Hématocrite	↘	↓ 18.7	↓ 20.6	↓ 16.2	↓ 14.0	↓ 18.5	↓ 22.9	40.0-50.0 %
☐ Volume moyen globulaire	↘	95.0	93.0	91.0	88.0	89.0	86.0	80.0-100.0 μm³
☐ Teneur corpusculaire moyenne en Hb	↘	↑ 32.3	31.8	↑ 32.1	30.7	↑ 32.2	29.3	27.0-32.0 pg
☐ Concentration corpusculaire moyenne en Hb	↘	34.3	34.0	35.3	34.7	36.0	34.9	32.0-36.0 %
☐ I. de distribution des globules rouges	↘	13.8	12.4	12.0	15.6	11.7	13.1	
HEMOGRAMME, NUMERATION DES PLAQUETTES								
☐ Plaquettes	↘	350	382	358	389	274	283	150-400 Giga/L
☐ Volume moyen plaquettaire	↘	5.9	6.0	5.4	6.7	6.1	7.5	μm³
HEMOGRAMME, FORMULE LEUCOCYTAIRE								
☐ Polynucléaires neutrophiles	↘	79.90	81.00	81.10	67.00	66.70	66.60	%
☐ Soit	↘	↑ 11.11	↑ 13.04	↑ 11.76	5.49	4.54	3.60	2.20-6.50 Giga/L
☐ Polynucléaires éosinophiles	↘	0.60	0.70	0.70	0.00	2.00	2.50	%
☐ Soit	↘	0.08	0.11	0.10	0.00	0.14	0.14	<0.50 Giga/L
☐ Polynucléaires basophiles	↘	0.00	0.40	0.20	0.00	0.30	0.90	%
☐ Soit	↘	0.00	0.06	0.03	0.00	0.02	0.05	<0.05 Giga/L
☐ Lymphocytes	↘	11.30	10.10	10.20	12.00	23.00	22.20	%
☐ Soit	↘	1.57	1.63	1.48	0.98	1.56	1.20	0.80-4.00 Giga/L
☐ Monocytes	↘	8.20	7.80	7.80	5.00	8.00	7.80	%
☐ Soit	↘	↑ 1.14	↑ 1.26	↑ 1.13	0.41	0.54	0.42	0.10-1.00 Giga/L
☐ Promyélocytes	↘				1.00			%
☐ Myélocytes neutrophiles	↘				10.00			%
☐ Métamyélocytes neutrophiles	↘				5.00			%
HEMOGRAMME								
☐ Réticulocytes	↘	10.4	7.8		5.6	5.0	3.0	%
☐ Soit	↘	205.00	176.00		88.80	102.00	79.00	Giga/L
HEMOSTASE								
COAGULATION PLASMATIQUE								
☐ Traitement anticoagulant?	↘				Non renseigné			
☐ Temps de Cénaline Activée	↘				?? ?			secondes

5 jours

Soit		
Date+Heure de prélèvement	Valeur	Normes
30/08/2011 06:38	297.00	
29/08/2011 06:00	277.00	
28/08/2011 06:00	242.00	

W	176.00		88.80	102.00	79.00	76.80
---	--------	--	-------	--------	-------	-------

INTATION

Anémies hémolytiques, diagnostics différentiels

Ictères non hémolytiques à bilirubine conjuguée :

ictères métaboliques.

hépatites virales.

ictères mixtes par **lithiase pigmentaire +++**

Ictères non hémolytiques à bilirubine libre :

maladie de Gilbert :

5 % population

pas de signe de régénération médullaire
déficit partiel en glycuronyltransférase.

maladie de Crigler-Najjar

déficit complet glycuronyltransferase.

mais hémoglobine et réticulocytose sont normales

Anémies hémolytiques, diagnostic étiologique

SIGNES ORIENTATION

Interrogatoire :

antécédents familiaux

ethniques

personnels : ictère dans l'enfance

récents : prise thérapeutique,
syndrome infectieux

Examen :

anomalies morphologiques

Rx :

anomalies de la voûte du crâne

épaississement des os de la voûte

"en poils de brosse".

brachycéphalie. ☞ visage mongoloïde

lithiase pigmentaire

Anémies hémolytiques, diagnostic étiologique

anomalies de la membrane érythrocytaire

microsphérocytose: maladie de Minkowski-Chauffard

elliptocytose : anomalies héréditaires du cytosquelette

stomatocytose: anémie hémolytique héréditaire avec hématies déshydratées

TEST de COOMBS

le test de coombs direct (TCD)

détecte *les anticorps situés à la surface des GR*
par un anticorps anti-Ig. (anti-IgG, antiIg-A, anti-C')
dépiste une auto-immunisation anti-érythrocytaire

➤ le test de coombs indirect (TCI)

détecte *les anticorps sériques libres dans le sérum:*

- 1) fixation des AC libres sur des GR témoins
- 2) test de Coombs direct

dépiste des agglutinines irrégulières
(allo-immunisation)

ANEMIE HEMOLYTIQUE

Test de COOMBS direct TCD

➤ recherche AC fixés sur les GR

ANEMIE HEMOLYTIQUE

Test de COOMBS indirect TCI

➤ recherche AC libres sériques

GR témoins

Anémies hémolytiques, diagnostic étiologique

◆ anomalies de Hémoglobine

Hématies en cible: Thalassémie ou Hémoglobinose E
hématies en faucille ou feuilles de houx: drépanocytose

Anémies hémolytiques, diagnostic étiologique

◆ anomalies des Enzymes

hématies ponctuées

corps de Heinz = augmentation de la metHb résiduelle
en présence d'un oxydant.

Anémies hémolytiques, diagnostic étiologique

◆ anomalies acquises 24/10/2017

schizocytes : hématies fragmentées (*syndrome de Moschowitz*)

dacryocytes : GR en forme de larme (*myélofibrose*)

echinocytes : GR en forme d'oursin : artéfact : frottis mal séché ou sang trop longtemps conservé ou certaines pathologies (ins rénale)

présence de parasites intra-érythrocytaires (*paludisme*)

Etude des différents constituants des GR

◆ étude de la membrane

étude de la résistance osmotique immédiate et après 24 h
↳ résistance globulaire aux solutés hypotoniques

↳ électrophorèse des protéines membranaires.

étude de l' Hémoglobine

rappel sur la structure de Hémoglobine

hème

noyau tétrapyrrolique

atome de fer

pathologie : **porphyries**

4 chaînes de globine

4 gènes α sur le chromosome 16

gènes β, γ, δ sur le chromosome 11

➤ Hémoglobine chez l'adulte

HbA $\alpha_2 \beta_2$ 97%

HbA2 $\alpha_2 \gamma_2$ 2%

HbF $\alpha_2 \delta_2$ 1%

exploration des anomalies de l'Hémoglobine

falciformation

électrophorèse de hémoglobine

- recherche Hb anormale
- pourcentage respectif de HbA1, A2, F

étude du 2-3DPG et de la courbe de dissociation de Hb.
étude en biologie moléculaire des gènes de la globine.

Frottis sanguin: Résumé

- A: Normal
- B: Micro/hypo
- C: Macro
- D: Cible
- E: microsphero
- F: corps de Heinz
- G: Schizocyte
- H: erythroblaste
- I: Polychrome
- J: Poïkylocytose