IG monoclonales et myélome

Arnaud Jaccard

Service d'hématologie et de thérapie cellulaire

CHU Limoges

17 avril 2019

317- Myélome multiple des os

- n Diagnostiquer un myélome multiple des os.
- n Connaître la démarche diagnostique en présence d'une gammopathie monoclonale.

Prévalence Ig monoclonale en fonction de l'âge (Kyle)

Ig monoclonale isolée : décès et progression

Circonstances de découvertes

- n En général découverte sur électrophorèse des protéides,
 - » soit bilan systématique (pas vraiment une bonne idée)
 - » Soit sur conséquence biologique de la présence du pic
 - n VS élevée avec CRP normale
 - n Hyperprotidémie
 - » Soit devant des anomalies cliniques ou biologiques
 - n Douleurs osseuses, lésions osseuses, fractures, tassements vertébraux, compression médullaire
 - n Hypercalcémie
 - n Insuffisance rénale
 - n Adénopathies ou splénomégalie
 - n Anémie ou autres anomalies de la numération
 - n Signes d'hyperviscosité
 - n Infections à répétition
 - n Pathologies associées aux Ig monoclonales : neuropathies, amyloses AL, etc ...

Myélome

Maladie de Waldenström

Déficit immunitaire humoral

α 2 globulines
Haptoglobine,
 α 2macroglobuline

γ globulines:
Immunoglobulines: IgG, A, M, D, E
CRP

albumine

globulines

α 1 globulines
 α 1 antitrypsine,
orosomucoïde

b1 globulines: IgM, IgA
b2 globulines:

Gammaglobulines: surtout IgG

Hypogamma = hypo-IgG

Attention hypergammaglobulinémies polyclonales

n Micro-pics multiples, banal dans les hypergammaglobulinémies polyclonales, étiologies ?

n Infections virales:

Caractérisation Ig monoclonale:

Immunofixation

Expression des résultats

n ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES

- » Protidémie : 70 g/l
- » Albumine : 44.2 g/l
- » Alpha 1 : 1.3 g/l
- » Alpha 2 : 7.2 g/l
- » Béta : 5.8 g/l
- » Gamma + pic: 11.5 g/l
- » **Pic 1 : 5.1 g/l**

n DOSAGE DES IMMUNOGLOBULINES

- n IgG 13.50 g/l
- n IgA 2.51 g/l
- n IgM 0.91 g/l

n RECHERCHE DE COMPOSANTE MONOCLONALE SERIQUE

- n Typage Pic 1
Composante monoclonale IgG Kappa

Expression des résultats

Protidémie	88	g/l
Albumine	35.8	g/l
Alpha 1	1.5	g/l
Alpha 2	5.4	g/l
Béta	5.7	g/l
Gamma + pic	39.6	g/l
Pic 1 :	38	g/l

DOSAGE DES IMMUNOGLOBULINES

IgG 57.50 g/l

IgA 0.26 g/l

IgM 0.36 g/l

RECHERCHE DE COMPOSANTE MONOCLONALE SERIQUE

Typage Pic 1 Composante monoclonale IgG Lambda

Présence d'un pic franc dans les gammas globulines
Diminution des Immunoglobulines Polyclonales

Typage Pic 2 : Composante monoclonale constituée de chaine légère Lambda

Myélome avec Ig complète ~80%

Myélome à chaîne légère ~20%

Myélome peu ou non sécrétant (1-2%)

Chaînes légères libres secrétées

Plasmocyte

plasmocyte

Kappa

Lambda

Excrétion par le rein, demi-vie courte 2 à 3 heures

Myélome à chaînes légères

n Electrophorèse des protides

2 techniques pour la détection des chaînes légères libres

- n Protéinurie des 24 heures (ou rapport protéinurie / créatininurie) avec électrophorèse des protides urinaires et immunofixation :

» Protéinurie : 12 gr/24 h

» Electrophorèse :

- n Albumine : 10%

- n Gammaglobuline : 80%

Si albumine > 30%
attention aux atteintes
glomérulaires

» IF: protéinurie de Bence-Jones Kappa de profil assez pur

Dosage des chaînes légères libres

- Anticorps dirigés contre des antigènes cryptiques sur les chaînes légères liées aux chaînes lourdes
- Taux physiologiques:
 - » polyclonal kappa < 16 mg/l
 - » polyclonal lambda < 26 mg/l
- Sensible +++ < 1 mg/l

Dosage des chaînes légères libres sérique :

- n Monoclonalité: déséquilibre du ratio Kappa/lambda

	Normes	Unités
Kappa	2.30-19.40	mg/L
Lambda	5.70-26.30	mg/L
Rapport	0.26-1.65	

Kappa
Lambda
Rapport

- n Augmentation polyclonale:
 - » Hypergamma polyclonale
 - » Insuffisance rénale ($k > l$)

IMMUNOCHIMIE		
PROTOCOLE RECHERCHE AMYLOSE		
☐ Freelite Kappa	W	13.0
☐ Freelite Lambda	W	↑ 225.0
☐ Rapport FLK/FLL	W	↓ 0.06

IMMUNOCHIMIE			170031528
PROTOCOLE RECHERCHE AMYLOSE			
☐ Freelite Kappa	W	↑ 19.70	
☐ Freelite Lambda	W	↑ 37.50	
☐ Rapport FLK/FLL	W		0.53

PROTOCOLE RECHERCHE AMYLOSE		
☐ Freelite Kappa	W	↑ 187.00
☐ Freelite Lambda	W	↑ 162.00
☐ Rapport FLK/FLL	W	1.15
AUTO IMMUNITÉ		

PROTOCOLE RECHERCHE AMYLOSE		
☐ Freelite Kappa	W	↑ 63.40
☐ Freelite Lambda	W	↑ 42.80
☐ Rapport FLK/FLL	W	1.48
AUTO IMMUNITÉ		

Dosage des chaînes légères libres sérique :

- n Monoclonalité: déséquilibre du ratio Kappa/lambda
- n Augmentation polyclonale:
 - » Hypergamma polyclonale
 - » Insuffisance rénale ($k > l$)
- n Attention aux excès d'antigènes
- n Pas de décision sur un seul dosage
- n Mieux que les urines de 24 heures pour la surveillance des myélomes à chaînes légères (ASH 2016)
- n Ne remplace pas la recherche d'albuminurie
- n 2 tests Binding Site et Siemens
- n Non remboursés (85 euros)

Indispensable pour le suivi dans les amyloses AL et les myélomes peu sécrétants

EP avant traitement

EP après Traitement

1^{ère} question si découverte Ig monoclonale

n Isotype Ig monoclonale

n IgG, IgA, chaînes légères seules : Myélome

n IgM : maladie de Waldenström ou lymphome non hodgkinien

Myelome multiple

n Prolifération de cellules plasmocytaires sécrétant une Ig

» le plus souvent

n IgG (57%)

n IgA (21%)

n chaînes légères seules (18%)

» IgD : 1/100, IgM: 1/1000

Myelome multiple

n Prolifération de cellules plasmocytaires sécrétant une Ig

» le plus souvent

n IgG (57%)

n IgA (21%)

n chaînes légères seules (18%)

» IgD : 1/100, IgM: 1/1000

» Toujours précédé par une phase de "MGUS"

Myélome

- n 2% des cancers
- n 10-12% des hémopathies malignes
- n Age médian : 70 ans, hommes > femmes
 - n < 3% < 40 ans

Figure 1

MGUS

- M spike <3 gm/dL
- PC <10%
- No CRAB criteria

Risque de progression MGUS en fonction des facteurs de risque

Ig > 15 gr/l

Non IgG

Rapport K/L anormal

MGUS non IgM: quel bilan

- n Très dépendant de facteurs
 - » Liés au patient
 - n Âge
 - n Symptomatique ou non
 - » Aux facteurs de risque d'évolution

- n Au minimum (patient âgé, IgG < 15 gr) : EP, protéinurie, NFS, créatinine, calcémie, chaînes légères libres ?

- n Si douleur : imagerie

- n Si doute sur myélome et/ou patient jeune : myélogramme (avec immunophénotypage et/ou cytogénétique)

- n Quelle surveillance ?

MGUS IgM: quel bilan

n Maladie de Waldenström ou LNH

- » Recherche ganglions et splénomégalie (clinique et imagerie)
- » NFS et Immunophénotypage des lymphocytes circulants
- » Examen médullaire ?
- » Attention :

n aux conséquences des activité auto-anticorps des IgM

- Facteurs rhumatoïdes (cryoglobuline type II)
- Anti- GR (agglutinines froides)
- Anti-MAG (neuropathie)

n Aux conséquences liées aux propriétés physico-chimiques de l'IgM

- Hyperviscosité
- Cryoglobulines de type I

Figure 1

Risque de progression myélome stade I et MGUS

Facteurs de risque de progression myélomes de stade I

Groupe 1 : Plasmo > 10% et Ig > 30 gr/l

Groupe 2 : Plasmo > 10% et Ig < 30 gr/l

Groupe 3 : Plasmo < 10% et Ig > 30 gr/l

Traitement pour les groupes I ?

- Ratio FLC
- plasmo médullaires normaux <5%
- t(4/14) ou del 17p
- plasmocytes circulants
- 1 lésion focale sur l'IRM
- TEP avec fixation mais sans lésion lytique

Diagnostic de myélome: infiltration plasmocytaire médullaire

n Myélogramme (+- BM) + cytométrie + études cytogénétiques (Fish)

n Prolifération plasmocytaire pathologique

augmentée quantitativement >10% => 20 à 60 %

soit avec des *anomalies cytoplasmiques* :

- cellules de Mott fortement vacuolées
- cellules à inclusion cristalline (avec corps de Russell).
- cellules flammées

soit *anomalies nucléaires* :

- cellules plurinucléées.
- images de division nucléaire
- volumineux nucléoles.

Les symptômes évocateurs

n **Manifestations osseuses :**

» Douleurs, souvent révélatrices

n squelette axial: rachis, côtes +++, bassin

n Fixes, tenaces, rebelles aux antalgiques

n Algies radiculaires (rechercher une compression médullaire)

» Tumeurs (rares)

» Tassement vertébral, fractures

Ostéolyse dans le Myélome : un cercle vicieux

Traitement

Fig. 3. Therapeutic approaches in myeloma bone disease. The osteoclast and osteoblast are potential therapeutic targets in the treatment of myeloma bone disease. Proteasome inhibitors and inhibitors of Dkk1 increase osteoblastic bone formation, whereas bisphosphonates and anti-RANKL inhibit osteoclastic bone resorption.

Myelome : lésions lytiques

Myelome : lésions lytiques

K du sein

K prostate

Myelome : lésions lytiques

Myelome : atteinte osseuse prédominante

- n Peut toucher l'ensemble du squelette
- n surtout vertèbres, crane, bassin, côtes, fémurs et humérus
- n responsable de douleurs +++

Myelome : atteinte osseuse prédominante

n risque de fractures

Myelome : atteinte osseuse prédominante

n risque de fractures

Myélome : ce que l'on veut éviter

Myelome : atteinte vertébrale fréquente et grave

IRM : performante pour rachis +++

T1: hypo-intense T2: hyper-intense
+ prise de gadolinium

IRM : détection des compressions médullaires

IRM : détection des compressions médullaires

Myélome : lyses

mais aussi tumeurs

Pet Scan

Figure 2. Outcome according to postinduction therapy PET/CT.

blood

2011 118: 5889-5995
Prepublished online September 6, 2011;
doi:10.1182/blood-2011-06-361385

Prognostic relevance of 18-F FDG PET/CT in newly diagnosed multiple myeloma patients treated with up-front autologous transplantation

Elena Zamagni, Francesca Patriarca, Cristina Nanni, Beatrice Zannetti, Emanuela Englaro, Annalisa Pezzi, Paola Tacchetti, Silvia Buttignol, Giulia Perrone, Annamaria Brioli, Lucia Pantani, Carolina Terragna, Francesca Carobolante, Michele Baccharani, Renato Farin, Stefano Fanti and Michele Cavo

Lésions quelquefois ostéocondensantes (2% des myélomes)

POEMS : critères diagnostiques

Table 1 Criteria for the diagnosis of poems syndrome*.

Major criteria	→	1. Polyneuropathy
	→	2. Monoclonal plasma cell-proliferative disorder (almost always λ)
		3. Sclerotic bone lesions
		4. Castleman disease
Minor criteria	→	5. Vascular endothelial growth factor elevation
		6. Organomegaly (splenomegaly, hepatomegaly, or lymphadenopathy)
		7. Extravascular volume overload (edema, pleural effusion, or ascites)
		8. Endocrinopathy (adrenal, thyroid, † pituitary, gonadal, parathyroid, pancreatic †)
		9. Skin changes (hyperpigmentation, hypertrichosis, glomeruloid hemangiomas, plethora, acrocyanosis, flushing, white nails)
		10. Papilledema
		11. Thrombocytosis/polycythemia ‡
Other symptoms and signs		Clubbing, weight loss, hyperhidrosis, pulmonary hypertension/restrictive lung disease, thrombotic diatheses, diarrhea, low vitamin B ₁₂ values
Possible associations		Arthralgias, cardiomyopathy (systolic dysfunction), and fever

POEMS, polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M protein, skin changes.

* Polyneuropathy and monoclonal plasma cell disorder present in all patients; to make diagnosis *at least* one other major criterion and 1 minor criterion is required.

‡ Anemia and/or thrombocytopenia are distinctively unusual in this syndrome unless Castleman disease is present.

† Because of the high prevalence of diabetes mellitus and thyroid abnormalities, this diagnosis alone is not sufficient to meet this minor criterion.

Myelome : rôle des examens d'imagerie osseuse

- n Staging initial
- n Détection des complications (si possible avant qu'elles ne surviennent)
- n Évaluer la réponse au traitement (RC +++)

Intérêt de l'IRM ou scanner low dose corps entier dans le Myélome Multiple

© 2014 American Association for Cancer Research

CCR Reviews

ACR

Scinti os : inutile
Pet-scan: suivi du traitement,
réponse complète ?

Les symptômes évocateurs

n **Cytopénies:** anémie ++ (fatigue, dyspnée d'effort)

n **Infections** : pneumocoque ++, *liées à la baisse des immunoglobulines polyclonales: déficit immunitaire humoral + lié aux traitements (corticoïdes +++)* .

n **insuffisance rénale:**

- » par précipitation intratubulaire de chaînes légères : rein de myélome
 - n Déclenchée par AINS, produits de contrastes iodés, déshydratation
- » Par hypercalcémie
- » amylose ou maladie des dépôts d'Ig

Quel myélome traiter en 2019

- n Myélome de stade I : surveillance (pour l'instant)

N ENGL J MED 369;5 NEJM.ORG AUGUST 1, 2013

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Lenalidomide plus Dexamethasone for High-Risk Smoldering Multiple Myeloma

C

Figure 1

Nouvelles définitions du myélome à traiter

blood

2013 122: 4172-4181

doi:10.1182/blood-2013-08-520890 originally published
online October 21, 2013

Smoldering multiple myeloma requiring treatment: time for a new definition?

Angela Dispenzieri, A. Keith Stewart, Asher Chanan-Khan, S. Vincent Rajkumar, Robert A. Kyle, Rafael Fonseca, Prashant Kapoor, P. Leif Bergsagel, Arleigh McCurdy, Morie A. Gertz, Martha Q. Lacy, John A. Lust, Stephen J. Russell, Steven R. Zeldenrust, Craig Reeder, Vivek Roy, Francis Buadi, David Dinali, Suzanne R. Havman, Nelson Leuna, Yi Lin, Joseph Mikhael and Shaii K. Kumar

International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma

S Vincent Rajkumar, Meletios A Dimopoulos, Antonio Palumbo, Joan Blade, Giampaolo Merlini, Maria-Victoria Mateos, Shaji Kumar, Jens Hillengass, Efstathios Kastritis, Paul Richardson, Ola Landgren, Bruno Paiva, Angela Dispenzieri, Brendan Weiss, Xavier LeLeu, Sonja Zweegman, Sagar Lonial, Laura Rosinol, Elena Zamagni, Sundar Jagannath, Orhan Sezer, Sigurdur Y Kristinsson, Jo Caers, Saad Z Usmani, Juan José Lahuerta, Hans Erik Johnsen, Meral Beksaç, Michele Cavo, Hartmut Goldschmidt, Evangelos Terpos, Robert A Kyle, Kenneth C Anderson, Brian G M Durie, Jesus F San Miguel

www.thelancet.com/oncology Vol 15 November 2014

Quels myélomes traiter en 2019

- n Myélome de stade I : surveillance (pour l'instant)

- n Myeloma defining events (Critères CRAB)
 - » Hypercalcémie
 - » Insuffisance rénale
 - » Anémie
 - » Atteinte osseuse

- n Nouveaux critères:
 - » > 60 % de plasmocytes dans la moelle (avec BM)
 - » Ratio chaînes légères monoclonales/polyclonales > 100 (avec BS)
 - » 2 ou plus lésions osseuses focales sur IRM ou TDM

Quels myélomes traiter ?

Leukemia (2014), 1–2

© 2014 Macmillan Publishers Limited All rights reserved 0887-6924/14

www.nature.com/leu

E Kastritis¹, LA Mouloupoulos², E Terpos¹, V Koutoulidis²
and MA Dimopoulos¹

¹Department of Clinical Therapeutics, School of Medicine, National
and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece and

LETTER TO THE EDITOR

The prognostic importance of the presence of more than one focal lesion in spine MRI of patients with asymptomatic (smoldering) multiple myeloma

Figure 1. Time to progression to symptomatic MM for patients with AMM and more than one focal lesion in spine MRI vs those with no focal lesions or with one focal lesion in spine MRI.

Pronostic

Antonio Palumbo, Michel Attal and Murielle Roussel

Clin Cancer Res 2011;17:1253-1263. Published online March 15, 2011.

Pronostic: cytogénétique

Development and validation of a cytogenetic prognostic index predicting survival in multiple myeloma

Aurore Perrot et al, JCO 2019

Score:

<0 favorable

0-1 intermédiaire

>1 défavorable

t(4;14): + 0,4

del(17p): + 1.2

trisomy 5: - 0,3

trisomy 21: + 0.3

gain 1q : + 0,5

del(1p32): + 0,8

Traitement actuel du myélome

n Patients < 65 ans

- » Inhibiteur du protéasome + IMiD + Dex, VTD ou VRD (4 cycles)
- » Traitement intensif avec autogreffe
- » 2 cycles idem consolidation
- » +/- entretien (lenalidomide ou bortezomib)

n Patients > 65 ans

- » Inhibiteur du protéasome + alkylant + corticoïdes (VMP), 9 à 12 cycles
- » Lenalidomide – dexaméthasone (au moins 18 mois)

+ bisphosphonates
+ prophylaxie des infections

EVOLUTION

Where We Were, Where We Are, Where We Are Going: Progress in Multiple Myeloma

2014 ASCO EDUCATIONAL BOOK

199

P. Leif Bergsagel, MD

Ixazomib
 Carfilzomib
 Daratumumab
 Selinexor
 Venetoclax
 Anti-PD1
 CAR T-cell

FIG 1. Improving 5-year survival in multiple myeloma.

Five-year survival rates from the SEER 1975-2010 database are plotted, with the introduction of active drugs noted on the bottom. A dramatic increased rate of improvement was noted for patients diagnosed from 1999 to 2005. If this trend has continued, the 5-year survival for a patient diagnosed in 2014 should be approximately 66%.

Etude MAIA

PFS et réponses

- Non atteinte dans le bras Dara-Rd versus 31,9 mois pour le bras Rd après un suivi médian de 28 mois

44 % de réduction du risque de progression ou de décès avec le traitement D-Rd

D'après la communication de T. Facon, Abstract #LBA-2, ASH 2018

Guérison du myélome ?

Blood dec 2018

Recommandation utilisation bisphosphonates

	Mayo Clinic (2006)	ASCO (2007)
Indications	<p>MM avec > 1 lésion lytique (RX) Ostéoporose ou ostéopénie à la DO : indication MM indolent : pas d'indication en dehors de protocoles</p>	<p>MM avec lésions lytiques ou TV (RX ou imagerie) Ostéopénie isolée (RX ou DO) : raisonnable Plasmocytome solitaire, MM indolent sans lésion osseuse, MGUS : pas d'indication Marqueurs biochimiques du remodelage osseux : non recommandés en routine pour le suivi Contrôle de la douleur en rapport avec l'ostéolyse et traitement d'appoint si radiothérapie ou chirurgie</p>
Fréquence	Perfusions mensuelles	Perfusions mensuelles
Durée	<p>2 ans Si plateau : espacement trimestriel malgré l'absence de donnée publiée* Reprise si rechute</p>	<p>2 ans Discuter l'arrêt si MM stable ou en réponse Reprise si rechute avec événement osseux</p>
Choix du BP	<p>Pam chez patients <i>de novo</i> Remplacement de Zol par Pam non conseillé : pas de publication démontrant que cela entraîne une diminution du risque d'ONM</p>	<p>Pam ou Zol toutes les 3-4 semaines Patient peut préférer Pam, car risque d'ONM Clo : alternative en dehors des USA</p>
Surveillance dentaire	<p>Examen complet avant début des BP avec extractions dentaires, si nécessaires Suivi annuel avec soins conservateurs ou extractions par chirurgien maxillo-facial Arrêt BP 1 mois avant l'extraction, reprise après cicatrisation complète Hygiène bucco-dentaire +++</p>	<p>Examen dentaire systématique et extractions avant le début des BP Traitement de toute infection active ou foyer potentiel Exclusion des procédures invasives, si possible Hygiène bucco-dentaire +++</p>
Insuffisance rénale	-	<p>Si IR préexistante : - réduire les doses de Pam et Zol et perfuser > 2 h (Pam) et > 15 min (Zol) - surveiller la créatininémie tous les mois et la protéinurie tous les 3-6 mois Si apparition d'IR : - Zol : diminution des doses si Cl 30-60 mL/min ; ne pas utiliser < 30 mL/min - Pam : perfuser en 4 à 6 h sans diminuer la dose si Cl < 30 mL/min</p>

Osteonecrosis of the Jaws – What Is It?

- ⊕ Exposed bone in the maxilla or mandible
- ⊕ Due to disruption of the resorption-remodeling cycle of bone and inhibition of endothelial cell proliferation
- ⊕ Poor healing and secondary infection can lead to loss of teeth and segments of jaw bones.

Pictures courtesy Dr. Sal Ruggiero

Traitements associés aux nouvelles molécules

n Velcade : Zelitrex

n Revlimid et Thali : risque de thrombose veineuse, d'autant plus que

» Myélome évolutif

» Association corticoïdes et chimiothérapie

» Autres facteurs de risque

n Aspirine petite dose ou héparine de bas poids moléculaire

Prophylaxie des infections

n Infections fréquentes dans les premiers mois

» Germes encapsulés, pneumopathies

n Oracilline, 2 M/J

» Si dex : pneumocystose :

n Bactrim Fort 1 cp 3 fois par semaine

» Si Velcade : 15% de Zona

n Zelitrex, 2/j

MGUS pas toujours asymptomatiques

Pathologies liées aux « petits clones B dangereux » où il n'y a souvent pas de prolifération réellement

Indépendantes de la masse tumorale

Review in translational hematology

BLOOD, 15 C

Dangerous small B-cell clones

Giampaolo Merlini and Marvin J. Stone

Table 1. Most common monoclonal component-related diseases

Diseases caused by M-protein aggregation

- Light chain-cast nephropathy
- AL amyloidosis
- Light chain-deposition disease
- Crystal-storing histiocytosis: adult Fanconi syndrome
- Cryoglobulinemia type I

Diseases caused by M-protein antibody activity

- Mixed cryoglobulinemia type II
- Monoclonal cold agglutinins
- Polyneuropathies

Reliées à la masse tumorale

(hyperviscosité, tubulopathie myélomateuse)

Monoclonal gammopathy-related renal diseases

Bridoux F et al. Kidney Int 2015

Monoclonal gammopathy of clinical significance: a novel concept with therapeutic implications

Jean-Paul Feraud, Frank Bridoux, Angela Dispenzieri, Arnaud Jaccard, Robert A. Kyle, Nelson Leung and Giampaolo Merlini

Table 1. Current pathophysiological classification of the main MGCS-related disorders: MGCS due to deposition of all or part of the Mlg

	Ultrastructural appearance of deposits	Main characteristics of monoclonal gammopathy	Main organ(s) involved	Reference
Organized				
AL amyloidosis	Fibrillar	λ LC (75%), κ LC (25%), IgM <10%	Systemic (heart 80%, kidney 70%)	8,57
Type I cryoglobulinemia	Microtubular/crystalline	IgG or IgM	Systemic (skin +++, kidney, peripheral nerve, systemic symptoms [crystal cryoglobulin])	12,28
Immunotactoid glomerulopathy/ GOMGD	Microtubular	CLL-like clonal proliferation (50%)	Kidney	13
Acquired Fanconi syndrome	Crystalline	κ LC (>90%, mostly Vκ1)	Kidney (proximal tubulopathy)	9
Crystal stinging histiocytosis	Crystalline	κ LC	Systemic (kidney, cornea, joints, lymphoid tissue)	10
Crystalline keratopathy	Crystalline	IgG	Cornea	11
Nonorganized				
MIDD		LCDD: LC only (usually κ LC) (80%, Vκ1 and Vκ4) HCDD: truncated HC only (mostly γ1 and γ3) LHCDD: LC + truncated HC	Systemic (kidney [~100%, glomerular and tubular basement membrane], liver [30%], heart [30%])	14,51,61
PGNMD		Usually IgG3	Kidney	15
Macroglobulinosis		IgM	Skin (dermal)	16

Table 2. Current pathophysiological classification of the main MGCS-related disorders: cytokine mediated or MGCS due to autoantibody activity, CAP activation, cytokine-mediated, or of unknown mechanism

	Mechanism	Main characteristics of monoclonal gammopathy	Main organ(s) involved	Reference
Autoantibody activity				
Type II mixed cryoglobulinemia*	Rheumatoid	IgM	Immune complex-mediated vasculitis, skin +++, kidney, peripheral nerve; may be systemic	28,60
C1 inhibitor deficiency	C1 inhibitor		Angioedema	26
Von Willebrand disease	vWF factor		Bleeding	26
Bullous skin diseases	Desmoglein junction - collagen VII		Skin	21
Xanthomatosis	Various lipoproteins	Usually IgG	Cholesterol accumulation in macrophages, skin and tendons, other localizations (non-relapsing xanthogranulomatous)	29,30
Cold agglutinin disease	Red blood cell Rf	IgM	Cold-induced skin manifestations + intravascular hemolysis	27
IgM-associated peripheral neuropathy	MAIg + + +	IgM	Peripheral nerve, motor polyneuropathy (ant-MAG)	22,23
	Gangliosides		CANMAD	
CAP* activation				
C3 glomerulopathy	Mechanism to be determined; autoantibody activity against CAP regulator protein factor H in some cases	IgG	Kidney only	33-34
Atypical hemolytic-uremic syndrome			Systemic	
Cytokine mediated				
POEMS syndrome	VEGF	λ LC (>100%), IgA 10%, Vκ1 (900%)	Peripheral nerve (100%) and various other manifestations	35,36
			Osteolytic bone lesions	
Unknown mechanism				
Sjögren's regenerative leukoerythrocytosis		IgG, IgA (rare)	Systemic	45
TEMPE syndrome		IgG	Systemic	44,47
Neuropathic dermatosis		IgA (>80% except Sweet syndrome)	Skin + + +; different types and (different associated manifestations)	39
Acquired oculic fever		Usually IgG; association with γ HCDD	Skin + + + Other manifestations: lung, digestive tract	43
Scleromyxedema		IgG with slow oligoclonal expansion; usually	Skin + + +; other localizations	40,41,52
Sclerodermia		IgG	Skin only	41
Schölerl's syndrome	Acquired autoinflammatory syndrome (by IL-1 deregulation?)	IgM	Skin + + +; systemic symptoms, osteolytic bone lesions	44
Specific low-titer nanobla myopathy			Exclusively muscles (distal and possibly proximal)	48

Monoclonal Gammopathy of Clinical Significance

En général faible masse tum

Inconnu?
Schnitzler,
mucinose, cutis
laxa, pyoderma,
myopathie à
batonnets ...

D'après JP Femand

Monoclonal Gammopathy of **Clinical** Significance (MGCS):

MGUS très fréquentes chez les patients âgés

Population adulte # 1%

> 70 yrs > 6%

> 90 yrs # 10 %

Association
Fortuite fréquente

Monoclonal Gammopathy of **Clinical** Significance (MGCS):

MGCS: entité particulière dans les gammopathies monoclonales

- Pour faire le diagnostic:

examen clinique et marqueurs biologiques:

peau, nerf, muscles, etc

protéinurie +++ et marqueurs cardiaques (amylose)

- Traitement précoce fondamental :

pour la survie et éviter les atteintes graves d'organes