

Conseils pour votre traitement

PURINETHOL® ou Mercaptopurine

HématoLim
Réseau d'Hématologie du Limousin

Présentation

- Comprimés jaunes sécables, dosage à 50 mg (boîte de 25).
- Disponible en pharmacie de ville.
- Conservation à température ambiante (ne dépassant pas 25°C) et à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Comment prendre Purinethol®

- Avalez les comprimés de Purinéthol® avec un grand verre d'eau puis buvez un autre verre d'eau immédiatement après.
- Prenez votre traitement comme prescrit, en une seule fois.
- Prenez les comprimés 15 à 30 minutes avant le petit déjeuner, à heure régulière.
- Ne prenez jamais un autre médicament sans l'accord de votre médecin.
- Si vous oubliez une prise, n'augmentez jamais le nombre de comprimés.
- Si vous vomissez, ne répétez jamais l'administration, cela peut être dangereux :
=> **informez-en votre médecin traitant et/ou votre hématologue.**

Centre de coordination Régional d'Hématologie du Limousin
Document élaboré en 01/2010



Principaux effets indésirables :

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

● Effets sur la moelle osseuse et le sang :

Ce médicament peut entraîner une baisse des globules rouges (anémie), des globules blancs (neutropénie = baisse des PolyNucléaires Neutrophiles - PNN < à 1500/mm³) et des plaquettes (thrombopénie) liée à la toxicité du produit, d'où l'importance de la surveillance régulière des prises de sang.

● Effets digestifs à type de nausées, vomissements, diarrhées :

Ils sont possibles à l'installation du traitement. Parlez-en avec votre médecin qui pourra vous prescrire, si besoin, un traitement antivomitif et/ou antidiarrhéique.

=> Si ces manifestations persistent et vous empêchent de boire en quantité suffisante, vous devez contacter votre médecin qui modifiera votre traitement.

● Effets sur le foie :

Ce médicament peut provoquer une jaunisse (ictère) réversible à l'arrêt du traitement.

=> Les contrôles sanguins du fonctionnement hépatique seront effectués régulièrement par votre médecin traitant afin de dépister ce risque et d'adapter votre traitement.

● Inflammation de la muqueuse buccale : mucite.

Elle est peu fréquente mais parfois gênante pour certains patients. Elle peut être améliorée par une hygiène buccale correcte.

=> Signalez-le à votre médecin traitant qui vous prescrira un traitement local et si besoin un traitement contre la douleur.

Purinethol® n'entraîne qu'exceptionnellement la chute des cheveux.



Pour toute autre manifestation indésirable apparue au cours du traitement, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant.