

# Conseils pour votre traitement

## ENDOXAN® ou Cyclophosphamide

**HématoLim**  
Réseau d'Hématologie du Limousin

### Présentation

- Comprimés blancs enrobés, dosage à 50 mg (boîte de 50)
- Disponible en pharmacie de ville
- Conservation à température ambiante (ne dépassant pas 25°C)

### Comment prendre Endoxan®

- Avalez les comprimés d'Endoxan® avec un grand verre d'eau puis buvez un autre verre d'eau immédiatement après.
- Prenez votre traitement comme prescrit, en une seule fois, le matin, à jeun (jamais au cours d'un repas), à heure régulière.
- Vous ne devez ni mâcher, ni couper, ni sucer les comprimés.
- Ne prenez jamais un autre médicament sans l'accord de votre médecin.
- Si vous oubliez une prise, n'augmentez jamais le nombre de comprimés.
- Si vous vomissez, ne répétez jamais l'administration, cela peut être dangereux :  
**=> informez-en votre médecin traitant et/ou votre hématologue.**

Centre de coordination Régional d'Hématologie du Limousin  
Document élaboré en 01/2010



# Principaux effets indésirables :

*Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.*

## ● Effets sur la moelle osseuse et le sang :

Ce médicament peut entraîner une baisse des globules rouges (anémie), des globules blancs (neutropénie = baisse des PolyNucléaires Neutrophiles - PNN < à 1500/mm<sup>3</sup>) et des plaquettes (thrombopénie) liée à la toxicité du produit, d'où l'importance de la surveillance régulière des prises de sang.

## ● Effets sur la vessie

Ce médicament est éliminé dans les urines sous forme active et peut irriter la paroi de la vessie. Pour éviter ce risque, buvez abondamment, urinez dès que besoin pour éviter l'accumulation du produit dans la vessie et privilégiez les boissons alcalines (Vichy, St Yorre, ...).

=> Si vous avez du sang dans les urines, prévenez immédiatement votre médecin traitant.

## ● Effets digestifs à type de nausées, vomissements, diarrhées :

Ils sont possibles à l'installation du traitement. Parlez-en avec votre médecin qui pourra vous prescrire, si besoin, un traitement antivomitif et/ou antidiarrhéique.

=> Si ces manifestations persistent et vous empêchent de boire en quantité suffisante, vous devez contacter votre médecin qui modifiera votre traitement.

## ● Effets sur la fertilité :

Il y a un risque fréquent d'aménorrhée (absence de règles) chez la femme et d'oligospermie (raréfaction des spermatozoïdes dans le sperme) chez l'homme.

Consultez le document d'information « La chimiothérapie orale – page 3 ».

## ● Endoxan® peut entraîner la chute des cheveux.

**Pour toute autre manifestation indésirable apparue au cours du traitement, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant.**