

Ne pas oublier

Assurez-vous à chaque fin de traitement de posséder une ordonnance de renouvellement pour les prochaines utilisations.

Contact

Pour toute question, vous pouvez contacter le service d'hématologie clinique et de thérapie cellulaire

Urgences

de 8h00 à 17h00 :
05 55 05 66 42

de 17h00 à 8h00 :
05 55 05 66 72



Coordinatrices douleur du réseau Hématolim :
Ludivine Levasseur, IDE,
et Fabienne Dardaillon, IDE

Document validé le 3 juin 2005 par
Dominique Vigier, cadre infirmier,
le Dr Stéphane Moreau, praticien hospitalier
et le Pr Dominique Bordessoule, chef de service



GUIDE D'UTILISATION D'ANESTHÉSIFIQUES LOCAUX

PAO - TA4_B42 - 07/2010

Contact réseau

Centre hospitalier universitaire de Limoges
2, avenue Martin Luther King - 87042 Limoges cedex

TÉL. : 05 55 05 55 55

www.chu-limoges.fr

Réseau Hématolim
Service d'hématologie clinique et de thérapie cellulaire
hôpital Dupuytren
chef de service : Pr Dominique Bordessoule



Hématologie clinique
et thérapie cellulaire



•Prévention de la douleur dans les actes invasifs

Qu'entend-on par actes invasifs ?

Certains actes sont nécessaires au diagnostic et au suivi de votre maladie, par exemple :

- ▶ prises de sang
- ▶ pose de cathéter périphérique
- ▶ ponction sur site implantable
- ▶ myélogramme
- ▶ ponction lombaire
- ▶ ponction pleurale
- ▶ ponction ganglionnaire
- ▶ ponction d'ascite

Lors de votre traitement, des injections thérapeutiques par voie sous cutanée peuvent vous être prescrites, par exemple :

- ▶ injection sous cutanée de différents produits : Aracytine®,
- ▶ facteurs de croissance :
 - EPO (Neorecormon, Aranesp, Eprex)
 - G-CSF (Neupogen, Granocyte, Neulasta)

Si vous craignez, les piqûres, ponctions, biopsies, ou injections diverses : n'hésitez pas à en parler !



Il est possible d'atténuer la douleur pouvant être induite par ces actes ou piqûres.

La douleur n'est pas une fatalité !

•Procédure Emla patch

L'application de patchs d'Emla se fait en respectant différentes étapes :

- 1 Anticiper avec votre médecin ou votre infirmière en leur faisant préciser l'endroit de la peau où l'acte invasif sera effectué.
- 2 Ouvrir le pansement, prendre le coin aluminium prévu à cet effet sans toucher la partie blanche du pansement qui contient l'émulsion anesthésique.
- 3 Appliquer le pansement adhésif afin que la pastille blanche recouvre la surface présumée du point de ponction. Ne pas appuyer sur la partie centrale. Assurer une bonne adhésion du pansement en appuyant fermement sur le pourtour.
- 4 Noter l'heure d'application : le pansement doit rester en place au minimum 60 minutes. Il n'y a pas de contre-indication à le laisser en place plusieurs heures.
- 5 Retirer le pansement avant la réalisation du geste présumé douloureux.



•Procédure crème Emla

L'application de la crème Emla se fait selon la procédure suivante :

- 1 Appliquer une quantité de crème grosse comme l'ongle du pouce en couche épaisse sur la zone cutanée à traiter.
- 2 Recouvrir d'un pansement adhésif hermétique.
- 3 A la fin du délai, retirer la crème à l'aide d'une compresse.



Durée d'application : minimum 1 heure
Durée d'anesthésie : 1 à 2 heures