

Conseils pour votre traitement

ALKERAN® ou Melphalan

HématoLim
Réseau d'Hématologie du Limousin

Présentation

- Comprimés pelliculés blancs, dosage à 2 mg (flacon de 50).
- Disponible en pharmacie de ville .
- Conservation au réfrigérateur (entre +2 et +8 °C).

Comment prendre Chloraminophène®

- Avalez les comprimés d'Alkeran® avec un grand verre d'eau puis buvez un autre verre d'eau immédiatement après.
- Vous ne devez, ni mâcher, ni couper, ni sucer les comprimés.
- Prenez votre traitement comme prescrit, plutôt en dehors des repas (15 à 30 minutes avant), à heure régulière.
- Ne prenez jamais un autre médicament sans l'accord de votre médecin.
- Si vous oubliez une prise, n'augmentez jamais le nombre de comprimés.
- Si vous vomissez, ne répétez jamais l'administration, cela peut être dangereux :
=> **informez-en votre médecin traitant et/ou votre hématologue.**

Centre de coordination Régional d'Hématologie du Limousin
Document élaboré en 04/2011



Principaux effets indésirables :

Ne soyez pas inquiets à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

● Effets sur la moelle osseuse et le sang :

Ce médicament peut entraîner une baisse des globules rouges (anémie), des globules blancs (neutropénie = baisse des PolyNucléaires Neutrophiles - PNN < à 1500/mm³) et des plaquettes (thrombopénie) liée à la toxicité du produit, d'où l'importance de la surveillance régulière des prises de sang.

Nb : Ces troubles pouvant continuer à s'aggraver après l'arrêt du traitement, le traitement sera temporairement interrompu dès la survenue d'une leucopénie ou d'une thrombopénie profonde.

● Effets digestifs :

Vous pouvez présenter des nausées, des vomissements et plus rarement des diarrhées ou stomatites (inflammation de la muqueuse buccale).

=> Si ces troubles persistent et vous empêchent de boire en quantité suffisante, vous devez contacter votre médecin qui modifiera votre traitement.

● Réactions allergiques :

De rares cas de réactions allergiques (urticaires, œdèmes, éruptions cutanées) ont été rapportés.

=> Signalez ces manifestations à votre médecin traitant.

● Effets sur le cycle hormonal :

Une modification de la fonction ovarienne chez la femme pré ménopausée est possible (absence de règles).

● Alkeran® entraîne rarement la chute des cheveux.

Pour toute autre manifestation indésirable apparue au cours du traitement, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant.